

## 5-НОК



### Код АТХ:

- [J01XX07](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нитроксолин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

**Таблетки, покрытые оболочкой** оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые, блестящие.

	<b>1 таб.</b>
нитроксолин	50 мг

**Вспомогательные вещества:** кальция гидрофосфат, лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, повидон К25, тальк очищенный, кросповидон, магния стеарат.

**Состав оболочки:** акации камедь, кармеллоза натрия, повидон К25, сахароза, кремния диоксид коллоидный, тальк очищенный, крахмал кукурузный, кальция карбонат, титана диоксид, краситель солнечный закат желтый Е110, краситель желтый хинолиновый Е104.

50 шт. - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антибактериальное.

Образует комплексы с металлсодержащими ферментами микробной клетки и блокирует ее метаболизм. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, некоторых грибов (рода *Candida* и др.)..

### Показания к применению:

Лечение острых, хронических и рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, вызванных чувствительными к нитроксолину микроорганизмами:

- пиелонефрит;
- цистит;
- уретрит;
- эпидидимит;
- инфицированная аденома или карцинома предстательной железы.

Профилактика инфекционных осложнений в послеоперационном периоде при хирургических вмешательствах на почках и мочеполовых путях, а также при диагностических и лечебных манипуляциях (катетеризация, цистоскопия).

Профилактика рецидивирующих инфекций мочевых путей.

## Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Инфекции мочевыводящих путей](#)
- [Пиелит](#)
- [Пиелонефрит](#)
- [Уретрит](#)
- [Цистит](#)
- [Эпидидимит](#)

## Противопоказания:

- катаракта;
- почечная недостаточность тяжелой степени (КК менее 20 мл/мин);
- тяжелая печеночная недостаточность;
- детский возраст до 3 лет;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- повышенная чувствительность к нитроксолину или другим компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к хинолинам.

## Способ применения и дозы:

Стандартная доза для **взрослых и подростков** составляет 400 мг/сут, разделенные на 4 приема (по 2 таб. 4 раза/сут). Максимальная доза - 800 мг/сут.

Средняя доза для **детей старше 5 лет** - 200-400 мг/сут, разделенные на 4 приема; для **детей 3-5 лет** - 200 мг/сут, разделенные на 4 приема.

Курс лечения - 2-4 недели, при необходимости терапию продолжают прерывистыми курсами (2 недели в течение месяца).

**Пациентам с почечной недостаточностью средней степени (КК более 20 мл/мин) и печеночной недостаточностью** рекомендуется использовать половину стандартной суточной дозы препарата - 200 мг/сут (по 1 таб. 4 раза/сут).

Таблетки следует принимать перед приемом пищи.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота (можно предупредить приемом препарата во время еды),

## **5-НОК**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

повышение активности печеночных трансаминаз.

*Со стороны ЦНС и периферической нервной системы:* атаксия, головная боль, парестезии, полиневропатия.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* тахикардия.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь.

*Прочие:* тромбоцитопения, повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови.

### **Передозировка:**

Данных о передозировке или клинических признаках отравления нитроксилином нет.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата 5-НОК не описано.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Нитроксилин не следует назначать одновременно с препаратами, содержащими гидроксихинолины или их производные.

При применении препарата у пациентов с нарушенной функцией почек из-за возможной кумуляции нитроксилина необходим врачебный контроль.

Не следует назначать курсы лечения более 4 недель без дополнительного обследования функции печени и почек.

На фоне лечения нитроксилином моча окрашивается в интенсивный желто-красный цвет.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Данных о влиянии на способность к управлению автомобилем или механизмами нет.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

5 лет.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/5-НОК>