

## АРТРА Хондроитин



### Код АТХ:

- [M01AX25](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Хондроитина сульфат](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капсулы** твердые желатиновые, непрозрачные, от белого до почти белого цвета; содержимое капсул - порошок от белого до почти белого цвета; допускается наличие специфического запаха.

	<b>1 капс.</b>
хондроитин сульфат натрия	250 мг
"_	500 мг
"_	750 мг

*Вспомогательные вещества:* мука рисовая, кремния диоксид, магния стеарат.

*Состав оболочки капсул:* желатин, титана диоксид.

15 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Стимулятор регенерации хрящевой ткани. Влияет на обменные процессы в гиалиновом и волокнистом хрящах, стимулирует биосинтез гликозаминогликанов. Замедляет резорбцию костной ткани и снижает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани. Уменьшает дегенеративные изменения и стимулирует восстановление хрящевой ткани суставов, облегчает боль в суставах и позвоночнике, увеличивает подвижность суставов, принимает участие в формировании костной ткани, связок, поддержании упругости и эластичности сосудистой стенки. При лечении остеоартроза облегчает симптомы заболевания и уменьшает потребность в НПВП. Замедляет резорбцию костной ткани и снижает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани. Терапевтический эффект сохраняется длительное время после окончания курса лечения.

**Фармакокинетика***Всасывание и распределение*

После приема внутрь более 70% хондроитина сульфата всасывается из ЖКТ. Биодоступность препарата составляет 13%. При однократном приеме внутрь в средней терапевтической дозе  $C_{max}$  в плазме отмечается через 3-4 ч, в синовиальной жидкости через 4-5 ч. Абсорбированный из ЖКТ препарат накапливается в синовиальной жидкости.

*Выведение*

Выводится почками.

**Показания к применению:**

- остеоартроз периферических суставов;
- остеохондроз позвоночника.

**Относится к болезням:**

- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)
- [Остеохондроз](#)

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутрь взрослым.

Капсулы по 250 мг - по 2 капс. 2 раза/сут.

Капсулы по 500 мг - по 1 капс. 2 раза/сут.

Капсулы по 750 мг - по 1-2 капс./сут.

Рекомендуемая продолжительность начального курса лечения - 6 месяцев. Период действия препарата после его отмены - 3-5 месяцев. Продолжительность повторных курсов лечения устанавливается врачом индивидуально.

**Побочное действие:**

*Редко:* аллергические реакции.

**Передозировка:**

Случаи передозировки неизвестны.

*Лечение:* промывание желудка, проведение симптоматической терапии.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется назначать при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) в связи с отсутствием опыта клинического применения у этой категории пациентов.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении возможно усиление действия непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков.

Препарат совместим с НПВП и ГКС.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с кровотечениями, а также пациентам со склонностью к кровотечениям.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 10° до 30°С. Срок годности – 3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/ARTRA\\_Hondroitin](http://drugs.thead.ru/ARTRA_Hondroitin)