Абисил



Код АТХ:

- D06BX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пихты сибирской терпены

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для местного и наружного применения масляный***	**1 пачка**
пихты сибирской терпены	20 %

5 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
10 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
15 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
20 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
30 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
15 мл - флакон-капельницы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
20 мл - флакон-капельницы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
25 мл - флакон-капельницы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает выраженное противовоспалительное, ранозаживляющее, антибактериальное, обезболивающее, антиэкссудативное действие, обусловленное свойствами природных терпеноидов, входящих в его состав. Обладает широким спектром противомикробной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе и к антибиотикоустойчивым штаммам. Создает оптимальные условия для заживления раневой поверхности мягких тканей, ускоряет процесс эпителизации, улучшает микроциркуляцию. При местном применении не всасывается и не оказывает местнораздражающего действия. Препарат не обладает токсическими свойствами, тератогенных, мутагенных и канцерогенных эффектов не выявлено, что позволяет его применять во всех возрастных группах

Показания к применению:

— в общехирургической практике: гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей (трофические язвы и длительно незаживающие гнойные послеоперационные и посттравматические раны, свищи, пролежни, ожоги и обморожения, абсцессы и флегмоны, в том числе челюстно-лицевой области);

— в стоматологии: стоматиты, пародонтоз, гингивит, альвеолит, осложнения при протезировании зубов;

— в оториноларингологии: отит, евстахиит, синусит, ринит, ринофарингит, фарингит, тонзиллит, состояния после тонзиллэктомии, ларингит и т.д.

— в дерматологии: рожистое воспаление, пиодермии.

Относится к болезням:

- Абсцесс
- Альвеолит
- Воспаление
- Гингивит
- Дерматит
- Евстахиит
- Ларингит
- Обморок
- Ожоги
- Отит
- Пародонтит
- Пролежни
- Раны
- Ринит
- Ринофарингит
- Синусит
- Стоматит
- Тонзиллит
- Фарингит
- Флегмона

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы:

Применяют местно, наружно.

При гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и мягких тканей предварительно проводят хирургическую обработку раневой поверхности и затем наносят препарат 1 - 2 раза в сутки равномерным тонким слоем. Длительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания (обычно 5-10 дней) и заканчивается при появлении свежих грануляций, островков эпителия или полной эпителизации.

При воспалительных процессах в челюстно-лицевой области после вскрытия и хирургической обработки абсцессов и флегмон в карманы и послеоперационные раны вводят тампоны, пропитанные раствором Абисила. Процедуру повторяют ежедневно 5-7 дней При заболеваниях полости рта обрабатывать пораженную поверхность слизистой оболочки 2-3 раза в день или применять турунды, смоченные препаратом. При отитах - ввести в наружный слуховой проход тампон, смоченный препаратом. При лечении ринита, синусита закапывают в каждый носовой ход по 1-2 капли 3-4 раза в день. При гайморитах препарат вводят в гайморову пазуху после ее предварительной санации.

При лечении тонзиллита и других воспалительных заболеваний горла - обрабатывать препаратом слизистые оболочки 2-3 раза в сутки.

При заболеваниях кожи - препарат наносят 1-3 раза в сутки тонким слоем на пораженные участки. Продолжительность курса индивидуальна и зависит от тяжести заболевания.

Побочное действие:

Кратковременное жжение в месте нанесения препарата. У лиц с повышенной чувствительностью к эфирным маслам возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует комбинировать с другими наружными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением флакон с препаратом необходимо взбалтывать.

Не допускать попадания препарата на конъюнктиву глаза, при попадании достаточно промыть глаз водой.

Не следует наносить на влажную кожу.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Abisil