

## Абисил



### Код АТХ:

- [D06BX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пихты сибирской терпены](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Раствор для местного и наружного применения масляный</b>	<b>1 пачка</b>
пихты сибирской терпены	20 %

5 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.  
10 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.  
15 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.  
20 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.  
30 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.  
50 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.  
15 мл - флакон-капельницы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.  
20 мл - флакон-капельницы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.  
25 мл - флакон-капельницы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат оказывает выраженное противовоспалительное, ранозаживляющее, антибактериальное, обезболивающее, антиэкссудативное действие, обусловленное свойствами природных терпеноидов, входящих в его состав. Обладает широким спектром противомикробной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе и к антибиотикоустойчивым штаммам. Создает оптимальные условия для заживления раневой поверхности мягких тканей, ускоряет процесс эпителизации, улучшает микроциркуляцию. При местном применении не всасывается и не оказывает местнораздражающего действия. Препарат не обладает токсическими свойствами, тератогенных, мутагенных и канцерогенных эффектов не выявлено, что позволяет его применять во всех возрастных группах

## Показания к применению:

— в общехирургической практике: гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей (трофические язвы и длительно незаживающие гнойные послеоперационные и посттравматические раны, свищи, пролежни, ожоги и обморожения, абсцессы и флегмоны, в том числе челюстно-лицевой области);

— в стоматологии: стоматиты, пародонтоз, гингивит, альвеолит, осложнения при протезировании зубов;

— в оториноларингологии: отит, евстахиит, синусит, ринит, ринофарингит, фарингит, тонзиллит, состояния после тонзиллэктомии, ларингит и т.д.

— в дерматологии: рожистое воспаление, пиодермии.

## Относится к болезням:

- [Абсцесс](#)
- [Альвеолит](#)
- [Воспаление](#)
- [Гингивит](#)
- [Дерматит](#)
- [Евстахиит](#)
- [Ларингит](#)
- [Обморок](#)
- [Ожоги](#)
- [Отит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Ринит](#)
- [Ринофарингит](#)
- [Синусит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)
- [Флегмона](#)

## Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость.

## Способ применения и дозы:

Применяют местно, наружно.

При гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и мягких тканей предварительно проводят хирургическую обработку раневой поверхности и затем наносят препарат 1 - 2 раза в сутки равномерным тонким слоем. Длительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания (обычно 5-10 дней) и заканчивается при появлении свежих грануляций, островков эпителия или полной эпителизации.

При воспалительных процессах в челюстно-лицевой области после вскрытия и хирургической обработки абсцессов и флегмон в карманы и послеоперационные раны вводят тампоны, пропитанные раствором Абисила. Процедуру повторяют ежедневно 5-7 дней. При заболеваниях полости рта обрабатывать пораженную поверхность слизистой оболочки 2-3 раза в день или применять турунды, смоченные препаратом. При отитах - ввести в наружный слуховой проход тампон, смоченный препаратом. При лечении ринита, синусита закапывают в каждый носовой ход по 1-2 капли 3-4 раза в день. При гайморитах препарат вводят в гайморову пазуху после ее предварительной санации.

При лечении тонзиллита и других воспалительных заболеваний горла - обрабатывать препаратом слизистые оболочки 2-3 раза в сутки.

При заболеваниях кожи - препарат наносят 1-3 раза в сутки тонким слоем на пораженные участки. Продолжительность курса индивидуальна и зависит от тяжести заболевания.

## Побочное действие:

## **Абисил**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Кратковременное жжение в месте нанесения препарата. У лиц с повышенной чувствительностью к эфирным маслам возможны аллергические реакции.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не следует комбинировать с другими наружными средствами.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Перед применением флакон с препаратом необходимо взбалтывать.

Не допускать попадания препарата на конъюнктиву глаза, при попадании достаточно промыть глаз водой.

Не следует наносить на влажную кожу.

### **Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

4 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Abisil>