

## Абомин



### Код АТХ:

- [A09AA](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Сычужные ферменты](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки** от светло-желтого до желтовато-серого цвета, двояковыпуклые, со слабым специфическим запахом, свойственным сычужному ферменту; допускаются вкрапления различной степени интенсивности, неоднородно распределенные на поверхности таблетки.

	<b>1 таб.</b>
абомин*	50 тыс.МЕ

*Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, кальция стеарат.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки безъязычковые контурные.

\* - сычужные ферменты телят и ягнят молочного возраста (с содержанием лактозы не менее 70%)

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат, получаемый из слизистой оболочки желудка телят и ягнят молочного возраста. Содержит сумму протеолитических ферментов, действующих на пищевые (преимущественно молочные) белки. Улучшает процесс пищеварения при недостаточности ферментной активности желудочного сока.

#### Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Абомин не предоставлены.

## Показания к применению:

Заболевания ЖКТ, сопровождающиеся нарушением переваривающей способности желудочного сока, в т.ч.:

- ахилия;
- гипо- и анацидные гастриты;
- диспепсия;
- состояния после резекции желудка;
- гастрит;
- гастроэнтерит;
- энтероколит.

## Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гастроэнтерит](#)
- [Диспепсия](#)
- [Энтерит](#)

## Противопоказания:

- детский возраст до 14 лет (для данной лекарственной формы);
- повышенная чувствительность к препарату.

## Способ применения и дозы:

**Детям старше 14 лет и взрослым** назначают внутрь по 1 таб. 3 раза/сут во время еды в течение 1-2 мес. При недостаточной эффективности разовая доза может быть увеличена до 2-3 таб. на прием, а курс лечения продлен до 3 месяцев.

При *острых гастритах, гастроэнтеритах и колитах* - по 1 таб. 3 раза/сут в течение 2-3 дней.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, изжога.

*Прочие:* аллергические реакции.

## Передозировка:

Случаев передозировки не установлено.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности применения препарата Абомин при беременности и в период лактации не предоставлены.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Абомин не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано: детский возраст до 14 лет (для данной лекарственной формы).

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С. Срок годности - 2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Abomin>