Абомин



Код АТХ:

- A09AA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Сычужные ферменты

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** от светло-желтого до желтовато-серого цвета, двояковыпуклые, со слабым специфическим запахом, свойственным сычужному ферменту; допускаются вкрапления различной степени интенсивности, неоднородно распределенные на поверхности таблетки.

	1 таб.
абомин*	50 тыс.МЕ

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, кальция стеарат.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные.

* - сычужные ферменты телят и ягнят молочного возраста (с содержанием лактозы не менее 70%)

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, получаемый из слизистой оболочки желудка телят и ягнят молочного возраста. Содержит сумму протеолитических ферментов, действующих на пищевые (преимущественно молочные) белки. Улучшает процесс пищеварения при недостаточности ферментной активности желудочного сока.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Абомин не предоставлены.

Показания к применению:

Заболевания ЖКТ, сопровождающиеся нарушением переваривающей способности желудочного сока, в т.ч.:

— ахилия;

— гипо- и анацидные гастриты;

— диспепсия;

— состояния после резекции желудка;

— гастрит;

— гастроэнтерит;

— энтероколит.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гастроэнтерит
- Диспепсия
- Энтерит

Противопоказания:

— детский возраст до 14 лет (для данной лекарственной формы);

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Детям старше 14 лет и взрослым назначают внутрь по 1 таб. 3 раза/сут во время еды в течение 1-2 мес. При недостаточной эффективности разовая доза может быть увеличена до 2-3 таб. на прием, а курс лечения продлен до 3 месяцев.

При *острых гастритах, гастроэнтеритах и колитах* - по 1 таб. 3 раза/сут в течение 2-3 дней.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, изжога.

Прочие: аллергические реакции.

Передозировка:

Случаев передозировки не установлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности применения препарата Абомин при беременности и в период лактации не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Абомин не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 14 лет (для данной лекарственной формы).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С. Срок годности **-** 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Abomin