

[Абомина Таблетки 50000 Ед](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Протеолитический фермент, действует на пищевые (преимущественно молочные) белки.

Показания к применению:

Заболевания ЖКТ, сопровождающиеся нарушением переваривающей способности и снижением кислотности желудочного сока (гастрит, гастроэнтерит, энтероколит).

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гастроэнтерит](#)
- [Энтерит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- синдром рвоты и срыгивания у детей раннего возраста.

Способ применения и дозы:

Внутрь, во время еды, по 1 таб. (50 тыс.ЕД) 3 раза/сут. Курс лечения - 1-2 мес. При недостаточной эффективности - 3 таб. на прием, курс продлевают до 3 мес.

При *острых гастритах, гастроэнтеритах и колитах* - по 1 таб. 3 раза/сут в течение 2-3 дней.

Детям в возрасте до года - по 1/2 детской таб. (10 тыс.ЕД), 2-5 лет - 1 таб., 6-9 лет - 2 таб., 10-14 лет - 3 таб. Курс лечения - 1-3 мес.

Побочное действие:

Возможно: тошнота, изжога.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте до года - по 1/2 детской таб. (10 тыс.Ед), 2-5 лет - 1 таб., 6-9 лет - 2 таб., 10-14 лет - 3 таб. Курс лечения - 1-3 мес.

Источник: http://drugs.thead.ru/Abomina_Tabletki_50000_Ed