Ацербин (мазь)



Код АТХ:

- D08A

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения однородная, белого цвета.

	1 г
яблочная кислота	4.5 мг
бензойная кислота	0.5 мг
салициловая кислота	0.133 мг

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает кератолитическим, антисептическим, ранозаживляющим действием.

Показания к применению:

— комплексное лечение поверхностных ожогов кожи, длительно незаживающих ран, трофических язв и пролежней.

Относится к болезням:

- Пролежни

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

— острая почечная недостаточность (при применении на большой поверхности тела длительное время);

— новорожденные дети.

Способ применения и дозы:

Наружно, после хирургической обработки ожогов, ран, трофических язв и пролежней мазь наносят тонким слоем на пораженную область 2-3 раза в день, с наложением стерильной повязки; после рубцевания - 1 раз в сутки.

Побочное действие:

Жжение в месте нанесения, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата. Возможны аллергические реакции, гипертермия.

Передозировка:

Случаев передозировки не выявлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания (отсутствуют данные о фармакокинетических свойствах Ацербина при беременности и в период грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для наружного применения и тем самым усилить их всасывание. Всосавшаяся салициловая кислота может усилить побочные эффекты метотрексата и пероральных гипогликемических лекарственных средств, производных сульфонилмочевины.

Особые указания и меры предосторожности:

Избегать контакта препарата со слизистой оболочкой глаз.

Если применение препарата не дает ожидаемого эффекта, необходимо обратиться к врачу.

При ожогах с большой площадью поражения лечение проводится только под наблюдением врача.

При лечении детей необходимо избегать обработки нескольких участков кожи одновременно.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и занятия другими видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Не выявлено.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при острой почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан у новорожденных детей.

Условия хранения:

При температуре от 15°С до 25°С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Acerbin_maz