Ацесоль



Код АТХ:

- B05BB01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Калия хлорид
- Натрия ацетат
- Натрия хлорид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для инфузий	**1 л**
натрия хлорид	5 г
калия хлорид	1 г
натрия ацетата тригидрат	2 г

200 мл - бутылки для крови и кровезаменителей (1) - пачки картонные.
200 мл - бутылки для крови и кровезаменителей (28) - ящики картонные.
400 мл - бутылки для крови и кровезаменителей (1) - пачки картонные.
400 мл - бутылки для крови и кровезаменителей (15) - ящики картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает дезинтоксикационное, плазмозаме-щающее, регидратирующее, диуретическое, противошоковое, антиагрегатное действие. Уменьшает гиповолемию, препятствует сгущению крови и развитию метаболического ацидоза, усиливает диурез, улучшает микроциркуляцию.

Показания к применению:

— дегидратация;

— интоксикация (дизентерия, пищевая токсикоинфекция, холера Эль-Тор).

Относится к болезням:

- Дизентерия
- Интоксикация
- Токсикоз
- Холера

Противопоказания:

— гиперкалиемия;

— алкалоз;

— хроническая почечная недостаточность;

— наличие противопоказаний к введению в организм больших количеств жидкости;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

В/в струйно и капельно.

При *тяжелых формах заболеваний* вводят в/в струйно (1-3 ч), при *легких формах* - в/в капельно, со скоростью 40-120 кап/мин (24-48 ч). Раствор вводят в количествах, необходимых для восстановления объема жидкости, потерянной с испражнениями, рвотными массами, мочой и потом. Баланс введенной и потерянной жидкости определяется каждые 6 ч.

Побочное действие:

Отеки, тахикардия, гиперкапиемия, редко - озноб.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением раствор необходимо подогреть до температуры тела (36-38°С). Лечение проводят под контролем гематокрита и концентрации электролитов крови.

В случае развития гиперкалиемии препарат заменяют раствором "Дисоль" до нормализации электролитного баланса.

Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки не является противопоказанием к его применению.

Несмачиваемость внутренней поверхности бутылок не является противопоказанием к применению препарата.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Acesol