

Ацесоль



Код АТХ:

- [B05BB01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Калия хлорид](#)
- [Натрия ацетат](#)
- [Натрия хлорид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для инфузий	1 л
натрия хлорид	5 г
калия хлорид	1 г
натрия ацетата тригидрат	2 г

200 мл - бутылки для крови и кровезаменителей (1) - пачки картонные.

200 мл - бутылки для крови и кровезаменителей (28) - ящики картонные.

400 мл - бутылки для крови и кровезаменителей (1) - пачки картонные.

400 мл - бутылки для крови и кровезаменителей (15) - ящики картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает дезинтоксикационное, плазмозамещающее, регидратирующее, диуретическое, противошоковое, антиагрегатное действие. Уменьшает гиповолемию, препятствует сгущению крови и развитию метаболического ацидоза, усиливает диурез, улучшает микроциркуляцию.

Показания к применению:

— дегидратация;

— интоксикация (дизентерия, пищевая токсикоинфекция, холера Эль-Тор).

Относится к болезням:

- [Дизентерия](#)
- [Интоксикация](#)
- [Токсикоз](#)
- [Холера](#)

Противопоказания:

- гиперкалиемия;
- алкалоз;
- хроническая почечная недостаточность;
- наличие противопоказаний к введению в организм больших количеств жидкости;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

В/в струйно и капельно.

При *тяжелых формах заболеваний* вводят в/в струйно (1-3 ч), при *легких формах* - в/в капельно, со скоростью 40-120 кап/мин (24-48 ч). Раствор вводят в количествах, необходимых для восстановления объема жидкости, потерянной с испражнениями, рвотными массами, мочой и потом. Баланс введенной и потерянной жидкости определяется каждые 6 ч.

Побочное действие:

Отеки, тахикардия, гиперкапиемия, редко - озноб.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением раствор необходимо подогреть до температуры тела (36-38°C). Лечение проводят под контролем гематокрита и концентрации электролитов крови.

В случае развития гиперкалиемии препарат заменяют раствором "Дисоль" до нормализации электролитного баланса.

Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки не является противопоказанием к его применению.

Несмачиваемость внутренней поверхности бутылок не является противопоказанием к применению препарата.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Acesol?page=1>