Ацилакт



Код АТХ:

- G01AX14

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лактобактерии ацидофильные

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** желтовато-серого или разных оттенков бежевого цвета, допускается "мраморность" окраски, круглые, с плоскими или слегка выпуклыми гладкими поверхностями, со специфическим запахом.

	1 доза
живые штаммы Lactobacillus acidophilus*	не менее 10^7

*лиофилизированные в среде культивирования с добавление защитной сахарозно-желатино-молочной среды и спрессованные в одну таблетку

Вспомогательные вещества: лактоза, кальция стеарат, тальк.

20 шт. - банки полипропиленовые (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки полипропиленовые (1) - пачки картонные.
20 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.
30 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.
60 шт. - банки полипропиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, включая стафилококки, шигеллы, энтеропатогенные кишечные палочки, протей, что определяет коррегирующее действие препарата при нарушениях бактериоценоза ротовой полости и кишечника.

Показания к применению:

При заболеваниях полости рта:

— воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта (глоссит, афтозный стоматит, язвенно-некротический гингивит);

— патологические изменения слизистой полости рта, сопровождающие системные заболевания (красный плоский лишай, мультиформная эксудатипная эритема, болезнь Шегрена);

— другие заболевания полости рта, связанные с дисбактериозом (гальванизм, множественные поражения зубов кариесом, пародонтит), подготовка к плановым челюстно-лицевым операциям с целью профилактики гнойно-воспалительных осложнений.

При заболеваниях ЖКТ:

— острые кишечные инфекции, пищевые токсикоинфекции, вызванные условно-патогенными микроорганизмами или неустановленной этиологии; ротавирусный гастроэнтерит;

— длительные кишечные расстройства, особенно у детей раннего возраста;

— затяжные и хронические колиты и энтероколиты инфекционной и неинфекционной этиологии, сопровождающиеся нарушением микрофлоры;

— среднетяжелая и легкая форма неспецифического язвенного колита у взрослых;

— ослабленные, часто болеющие дети и взрослые с явлениями дисбактериоза. в том числе сопровождающегося иммунодефицитным состоянием;

— комплексная терапия атонического дерматита у детей с явлениями дисбактериоза кишечника.

Корригирующую терапию ацилактом можно назначить после курса лечения бактериофагами.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гастроэнтерит
- Дерматит
- Дисбактериоз
- Инфекции
- Кариес
- Колит
- Лишай
- Пародонтит
- Стоматит
- Токсикоз
- Энтерит
- Эритема

Противопоказания:

Не установлены.

Способ применения и дозы:

В зависимости от заболевания препарат применяют через рот, без предварительного растворения, запивая кипяченой водой комнатной температуры или рассасывая.

Суточную дозу и продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от клинической формы заболевания и выраженности дисбактериоза.

При заболеваниях полости рта:

При заболеваниях слизистой оболочки препарат применяют после еды, рассасывая таблетку.

При глоссите назначают 5 доз в сутки в 2-3 приема, курс лечения составляет 14-15 дней. При рецидивирующем афтозном стоматите и язвенно-некротическом гингивите лечение проводят по такой же схеме двумя курсами с перерывом в 7 дней.

При патологических процессах в полости рта, обусловленных системными заболеваниями, назначают по 10 доз в сутки в 4 приема двумя курсами по 14-15 дней каждый с перерывом в 7 дней.

При заболеваниях ЖКТ:

Таблетированный препарат принимают внутрь не позднее, чем за 20-30 мин до еды, запивая водой.

Больным с кишечными расстройствами назначают по 5 доз 2-3 раза в сутки.

При острых воспалительных процессах кишечника курс лечения составляет 7-8 дней, при затяжных и рецидивирующих формах заболевания - 14-21 день.

При необходимости врач назначает повторные курсы под контролем лабораторных показателей.

При нарушениях нормальной микрофлоры кишечника у детей с атопическим дерматитом по 5 доз в сутки курсами 20 - 25 дней, с перерывами в 1,5 - 2 мес. Количество курсов определяется состоянием кожного покрова и нормализацией микрофлоры кишечника.

Побочное действие:

Не выявлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Лактобактерии являются представителями нормальной микрофлоры человека. Поэтому, препараты, изготовленные на их основе, могут применяться при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение таблеток возможно сочетать с одновременным проведением антибактериальной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

Препарат не влияет на выполнение видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, машинным оборудованием и т.п.).

Применение в детском возрасте

Препарат разрешен к применению у детей.

Условия хранения:

Препарат хранят в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 10°С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности - 1 год.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Acilakt