

## [Ацилакт \(лиофилизат\)](#)



### Код АТХ:

- [G01AX14](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лактобактерии ацидофильные](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

♦ <b>Лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения</b>	<b>1 фл.</b>
<b>Lactobacillus acidophilus</b>	не менее 50 млн.КОЕ

5 доз - флаконы (10) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

*Биологические и иммунологические свойства:* живые микробные клетки лактобактерии ацидофильных обладают высокой антагонистической активностью в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, что определяет коррегирующее действие препарата при нарушениях бактериоценоза ротовой полости, кишечника и женских гениталий.

### Показания к применению:

*При заболеваниях полости рта:*

— воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта (глоссит, афтозный стоматит, язвенно-некротический гингивит);

— патологические изменения слизистой полости рта, сопровождающие системные заболевания (красный плоский лишай, мультиформная экссудативная эритема, болезнь Шегрена);

## Ацилакт (лиофилизат)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

— другие заболевания полости рта, связанные с дисбактериозом (гальванизм, множественные поражения зубов кариесом, пародонтит), подготовка к плановым челюстно-лицевым операциям с целью профилактики гнойно-воспалительных осложнений.

*При заболеваниях желудочно-кишечного тракта:*

— острые кишечные инфекции, пищевые токсикоинфекции, вызванные условно-патогенными микроорганизмами или неустановленной этиологии, ротавирусный гастроэнтерит;

— длительные кишечные расстройства, особенно у детей раннего возраста;

— затяжные и хронические колиты и энтероколиты инфекционной и неинфекционной этиологии, сопровождающиеся нарушением микрофлоры;

— среднетяжелая и легкая форма неспецифического язвенного колита у взрослых;

— ослабленные часто болеющие дети и взрослые с явлениями дисбактериоза, в том числе сопровождающегося иммунодефицитным состоянием;

— комплексная терапия атопического дерматита у детей с явлением дисбактериоза кишечника.

*При заболеваниях женской половой сферы:*

— кольпиты (за исключением случаев гонококковой, трихомонадной и кандидозной этиологии) - ацилакт назначают как самостоятельное средство после окончания курса антибактериальной терапии

— дисбактериозы влагалища, сопровождающие воспалительные процессы шейки, тела и придатков матки - после окончания курса антибактериальной терапии;

— подготовка к плановым гинекологическим операциям с целью профилактики послеоперационных инфекционных осложнений;

— предродовая подготовка беременных групп риска по развитию гнойносептических осложнений.

## Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гастроэнтерит](#)
- [Гингивит](#)
- [Дерматит](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Инфекции](#)
- [Кариес](#)
- [Колит](#)
- [Кольпит](#)
- [Кольпит](#)
- [Лишай](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)
- [Токсикоз](#)
- [Энтерит](#)
- [Эритема](#)

## Противопоказания:

Не рекомендуется применять при вульвовагинальных кандидозах.

## Способ применения и дозы:

В зависимости от заболевания ацилакт применяют внутрь, местно и интравагинально.

Содержимое флакона растворить кипяченой водой комнатной температуры из расчета 5 мл (чайная ложка) воды на 1 дозу препарата.

Растворение осуществить следующим образом: в стакан налить необходимое количество воды (в соответствии с количеством доз, указанных на флаконе); вскрыть флакон, удалив колпачок и пробку; из стакана перенести во флакон небольшое количество воды; после растворения (препарат растворяется не более 5 мин с образованием гомогенной суспензии бежевого или беловато-серого цвета) содержимое флакона перенести в тот же стакан,

---

## **Ацилакт (лиофилизат)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

перемешать. Одна чайная ложка растворенного таким образом препарата составляет 1 дозу. Растворенный препарат хранению не подлежит.

Суточную дозу и продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от клинической формы заболевания и выраженности дисбактериоза.

При заболеваниях слизистой оболочки полости рта ацилакт применяют после еды в виде водной взвеси для полосканий.

При глоссите назначают по 5 доз 2-3 раза в день, курс лечения составляет 14-15 дней. При рецидивирующем афтозном стоматите и язвенно-некротическом гингивите лечение проводят по такой же схеме двумя курсами с перерывом в 7 дней.

При патологических процессах в полости рта, обусловленных системными заболеваниями (красный плоский лишай, мультиформная экссудативная эритема, болезнь Шэгрена), назначают по 10 доз в день в 4 приема двумя курсами 14-15 дней каждый с перерывом в 7 дней.

Больным с кишечными расстройствами в возрасте до 6 месяцев назначают по 5 доз в сут желательно в 2 приема, детям старше 6 месяцев и взрослым - по 5 доз в 2-3 раза в сут за 30-40 мин до еды.

При острых воспалительных процессах кишечника курс лечения составляет 7-8 дней, при затяжных и рецидивирующих формах заболевания - 14-21 день.

При нарушениях нормальной микрофлоры кишечника у детей с атопическим дерматитом по 5 доз в сутки курсами 20-25 дней, с перерывами в 1,5 - 2 месяца. Количество курсов определяется состоянием кожного покрова и нормализацией микрофлоры кишечника.

При необходимости врач назначает повторные курсы.

При воспалительных процессах женских гениталий назначают интравагинально по 5 доз 2 раза в день, путем орошения водной взвесью препарата или введением пропитанного ею тампона. С целью профилактики гнойно-септических осложнений применяют по 5 доз 1 раз в день в течение 5-7 дней до предполагаемой операции или родоразрешения.

### **Побочное действие:**

Не выявлены.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Лактобактерии являются представителями нормальной микрофлоры человека, поэтому препараты, изготовленные на их основе, могут применяться при беременности и в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. Ацилакт можно применять одновременно с антибактериальной, противовирусной и иммуномодулирующей терапией. Корректирующую терапию ацилактом можно назначить после курса лечения специфическими бактериофагами, предназначенными для элиминации условно-патогенных бактерий.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат не влияет на выполнение видов деятельности требующей особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, машинным оборудованием и т. п.).

#### ***Применение в детском возрасте***

Применение возможно согласно режиму дозирования.

### **Условия хранения:**

Условия хранения: препарат хранится в соответствии с СП 3.3.2.1248-03, при температуре от 2 до 8°C, в недоступном

## **Ацилакт (лиофилизат)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

для детей месте.

*Срок годности.* 1 год.

*Условия транспортирования:* транспортирование осуществляют в соответствии с СП 3.3.2.1248-03, при температуре от 2 до 8°C.

*Препарат непригоден для применения:*

- при истечении срока годности или при хранении с несоблюдением регламентированных условий;
- целостность упаковки нарушена (треснувшие флаконы);
- без маркировки на флаконе;
- с измененными физическими свойствами (изменение цвета, сморщивание биомассы), при наличии посторонних включений.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Acilakt\\_liofilizat](http://drugs.thead.ru/Acilakt_liofilizat)