Ацилакт (свечи)



Код АТХ:

- G01AX14

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лактобактерии ацидофильные

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Живые лактобактерии, входящие в препарат, обладают антагонистической активностью в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных бактерий (включая стафилококки, протей, энтеропатогенную кишечную палочку), нормализуют пищеварительную деятельность ЖКТ, улучшают обменные процессы, способствуют восстановлению естественного иммунитета. Метаболизируют гликоген вагинального эпителия до молочной кислоты, которая поддерживает pH влагалища на уровне 3.8-4.2. Молочная кислота в высокой концентрации создает неблагоприятные условия для жизнедеятельности кислочувствительных патогенных и условно-патогенных бактерий.

Показания к применению:

Дисбактериоз ЖКТ различной этиологии (в т.ч. у детей, начиная с первых суток жизни), заболевания полости рта; дисбактериоз урогенитального тракта, в т.ч. при воспалительных заболеваниях мочеполовых путей инфекционной и неинфекционной природы - гонорея, урогенитальный хламидиоз, урогенитальный герпес, бактериальный вагиноз

(гарднереллез), гормонозависимые кольпиты (сенильные и др.); подготовка к плановым гинекологическим операциям (для профилактики послеоперационных инфекционных осложнений); предродовая подготовка беременных женщин группы риска в отношении воспалительных заболеваний (для профилактики и лечения дисбактериоза влагалища).

Относится к болезням:

- Вагинит
- Герпес
- Гонорея
- Дисбактериоз
- Инфекции
- Кольпит
- Кольпит

Противопоказания:

Гиперчувствительность, кандидоз, детский возраст (таблетки).

Способ применения и дозы:

Препарат содержит в 1 дозе не менее 10 млн живых ацидофильных лактобактерий. Таблетка или суппозиторий содержат 1 дозу препарата.

Пероральные лекарственные формы - внутрь, за 30-40 мин до еды 2-3 раза в сутки. При *острых воспалительных процессах* **грудным детям** - по 2-3 дозы, **детям старших возрастов и взрослым** - по 5 доз в течение 7-8 сут; при *затяжных и рецидивирующих формах заболевания* **грудным детям** - по 2-3 дозы, **детям старших возрастов и взрослым** - по 5 доз в течение 14-25 сут.

При *заболеваниях слизистой оболочки полости рта* - 4-6 доз путем рассасывания (в таблетках) или 5 доз в виде орошений (раствор) 2-3 раза в день в течение 14-15 сут.

Интравагинально - в виде орошений, аппликаций и суппозиториев.

При *воспалительных процессах урогенитального тракта* - по 5 доз (в виде раствора) или по 1 дозе (1 суппозиторий) 2 раза в день в течение 5-10 сут.

При *нарушении чистоты вагинального секрета* у **беременных** женщин до III-IV ст. - по 1 суппозиторию 1-2 раза в день в течение 5-10 дней и более, до исчезновения клинических симптомов и восстановления чистоты вагинального секрета до I-II ст.

С целью *профилактики гнойно-септических осложнений* применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в день в течение 5-10 дней (до предполагаемой операции или родоразрешения).

Восстановительная терапия после применения антибиотиков - ректально, по 1 суппозиторию 1-2 раза в день в течение 10 дней. Курс повторяют в течение 3-4 мес с интервалом 10-20 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Допускается одновременное проведение химио- и антибиотикотерапии.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение суппозиториев можно сочетать с одновременным назначением антибактериальных, противовирусных и иммуномодулирующих ЛС.

Не пригодны к применению суппозитории, имеющие запах прогорклого масла, или с нарушенной упаковкой.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте (таблетки).

Источник: http://drugs.thead.ru/Acilakt_svechi