

Аципол



Код АТХ:

- [A07FA51](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Грибки кефирные](#)
- [Лактобактерии ацидофильные](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капсулы;** содержимое капсул - сухая биомасса от светло-кремового до кремового цвета с кисломолочным запахом.

	1 капс.
живые ацидофильные лактобациллы	10 ⁷ КОЕ
полисахарид кефирного грибка	400 мкг

Вспомогательные вещества: желатин, железа оксид красный, титана диоксид.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры. Представляет собой лиофилизированную в среде культивирования смесь микробной массы живых антагонистически активных ацидофильных лактобацилл и инактивированных прогреванием кефирных грибков, содержащих водорастворимый полисахарид, которые определяют терапевтический эффект Аципола.

По механизму действия Аципол является многофакторным лечебным препаратом, обладает антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, оказывает корректирующее действие на микрофлору кишечника, повышает иммунологическую реактивность организма.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Аципол не предоставлены.

Показания к применению:

Дисбактериоз и состояния, приводящие к его развитию:

- острые кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, ротавирусный гастроэнтерит);
- хронические колиты;
- энтероколиты инфекционного и неинфекционного генеза;
- длительная антибактериальная терапия.

Дисбактериоз и дефицит массы тела, связанные с:

- активной антибиотикотерапией гнойно-септических заболеваний у грудных детей;
- хроническими, затяжными, рецидивирующими заболеваниями органов дыхания (бронхиты, пневмонии, в т.ч. пневмоцистные);
- атопическим дерматитом и другими аллергическими проявлениями.

Профилактика дисбактериоза (повышение общей резистентности организма).

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Бронхит](#)
- [Гастрит](#)
- [Гастроэнтерит](#)
- [Дерматит](#)
- [Дизентерия](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Инфекции](#)
- [Колит](#)
- [Пневмония](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Энтерит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают **детям старше 3 месяцев и взрослым** в сочетании с традиционным лечением.

Капсулы принимают внутрь, не разжевывая, запивая кипяченой водой.

Суточная доза и продолжительность лечения устанавливаются индивидуально в зависимости от возраста, тяжести и длительности заболевания и выраженности дисбактериоза.

Аципол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Детям в возрасте от 3 мес до 3 лет назначают по 1 капсуле 2-3 раза/сут (вместе с приемом пищи), предварительно вскрыв капсулу и растворив ее содержимое в молоке или кипяченой воде.

Взрослым и детям старше 3 лет назначают по 1 капсуле 3-4 раза/сут за 30 мин до приема пищи.

При *острых кишечных инфекциях* препарат назначают в течение 5-8 дней.

Более длительные курсы назначают при лечении детей с отставанием в весе, вызванным хроническим течением заболеваний, сопровождающихся дисбактериозом.

С *профилактической целью* Аципол назначают по 1 капсуле 1 раз/сут в течение 10-15 дней.

Повторные курсы проводят не ранее чем через 1 мес после окончания предыдущего лечения.

Побочное действие:

Побочное действие при применении Аципола в рекомендуемых дозах не установлено.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Аципол не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о применении препарата Аципол при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Аципол не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Не пригоден к применению:

- препарат, целостность внутренней упаковки которого нарушена;
- препарат без маркировки или с нечеткой маркировкой;
- препарат с измененными физическими свойствами (нарушена форма капсулы), при наличии посторонних включений;
- препарат с истекшим сроком годности.

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте от 3 мес до 3 лет назначают по 1 капсуле 2-3 раза/сут (вместе с приемом пищи), предварительно вскрыв капсулу и растворив ее содержимое в молоке или кипяченой воде. **Детям старше 3 лет** назначают по 1 капсуле 3-4 раза/сут за 30 мин до приема пищи.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 10°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Acipol>