Аципол



Код АТХ:

- A07FA51

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Грибки кефирные
- Лактобактерии ацидофильные

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы***; содержимое капсул - сухая биомасса от светло-кремового до кремового цвета с кисломолочным запахом.

	1 капс.
живые ацидофильные лактобациллы	10^7 КОЕ
полисахарид кефирного грибка	400 мкг

Вспомогательные вещества: желатин, железа оксид красный, титана диоксид.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры. Представляет собой лиофилизированную в среде культивирования смесь микробной массы живых антагонистически активных ацидофильных лактобацилл и инактивированных прогреванием кефирных грибков, содержащих водорастворимый полисахарид, которые определяют терапевтический эффект Аципола.

По механизму действия Аципол является многофакторным лечебным препаратом, обладает антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, оказывает корригирующее действие на микрофлору кишечника, повышает иммунологическую реактивность организма.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Аципол не предоставлены.

Показания к применению:

Дисбактериоз и состояния, приводящие к его развитию:

— острые кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, ротавирусный гастроэнтерит);

— хронические колиты;

— энтероколиты инфекционного и неинфекционного генеза;

— длительная антибактериальная терапия.

Дисбактериоз и дефицит массы тела, связанные с:

— активной антибиотикотерапией гнойно-септических заболеваний у грудных детей;

— хроническими, затяжными, рецидивирующими заболеваниями органов дыхания (бронхиты, пневмонии, в т.ч. пневмоцистные);

— атопическим дерматитом и другими аллергическими проявлениями.

Профилактика дисбактериоза (повышение общей резистентности организма).

Относится к болезням:

- Аллергия
- Бронхит
- Гастрит
- Гастроэнтерит
- Дерматит
- Дизентерия
- Дисбактериоз
- Инфекции
- Колит
- Пневмония
- Сальмонеллез
- Энтерит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назачают **детям старше 3 месяцев и взрослым** в сочетании с традиционным лечением.

Капсулы принимают внутрь, не разжевывая, запивая кипяченой водой.

Суточная доза и продолжительность лечения устанавливаются индивидуально в зависимости от возраста, тяжести и длительности заболевания и выраженности дисбактериоза.

Детям в возрасте от 3 мес до 3 лет назначают по 1 капсуле 2-3 раза/сут (вместе с приемом пищи), предварительно вскрыв капсулу и растворив ее содержимое в молоке или кипяченой воде.

Взрослым и детям старше 3 лет назначают по 1 капсуле 3-4 раза/сут за 30 мин до приема пищи.

При *острых кишечных инфекциях* препарат назначают в течение 5-8 дней.

Более длительные курсы назначают при лечении детей с отставанием в весе, вызванным хроническим течением заболеваний, сопровождающихся дисбактериозом.

С *профилактической целью* Аципол назначают по 1 капсуле 1 раз/сут в течение 10-15 дней.

Повторные курсы проводят не ранее чем через 1 мес после окончания предыдущего лечения.

Побочное действие:

Побочное действие при применении Аципола в рекомендуемых дозах не установлено.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Аципол не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о применении препарата Аципол при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Аципол не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Не пригоден к применению:

— препарат, целостность внутренней упаковки которого нарушена;

— препарат без маркировки или с нечеткой маркировкой;

— препарат с измененными физическими свойствами (нарушена форма капсулы), при наличии посторонних включений;

— препарат с истекшим сроком годности.

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте от 3 мес до 3 лет назначают по 1 капсуле 2-3 раза/сут (вместе с приемом пищи), предварительно вскрыв капсулу и растворив ее содержимое в молоке или кипяченой воде. **Детям старше 3 лет** назначают по 1 капсуле 3-4 раза/сут за 30 мин до приема пищи.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 10°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Acipol