

Адапален



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Адапален](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения 0.1%** белого цвета.

	100 г
адапален	100 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 5 г, карбомер (карбопол) - 1.1 г, метилпарабен - 0.10 г, динатрия эдетат - 0.1 г, полоксамер 188 - 0.2 г, феноксиэтанол - 0.25 г, натрия гидроксид - 0.2 г, вода очищенная - до 100 г.

15 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Адапален - метаболит ретиноида, обладает комедонолитической и противовоспалительной активностью, нормализует процессы кератинизации и эпидермальной дифференцировки.

Механизм действия адапалена основан на взаимодействии, со специфическими рецепторами эпидермальных клеток кожи. В результате действия адапалена, в частности, происходит снижение «сцепленности» эпителиальных клеток в устье сально-волосяного фолликула и уменьшение, предпосылок для образования микрокомедонов. Адапален оказывает противовоспалительное действие *in vivo* и *in vitro*, воздействуя на факторы воспаления путем иигибирования миграции лейкоцитов в очаге воспаления и метаболизма арахидоновой кислоты.

Показания к применению:

— угревая сыпь.

Противопоказания:

— беременность, период лактации;

Адапален

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

— детский возраст до 12 лет;

— гиперчувствительность.

С осторожностью: дерматит, себорея, экзема.

Способ применения и дозы:

Наружно, наносят 1 раз в день перед сном на чистую сухую кожу, равномерно, легким прикосновением, избегая попадания в глаза и на губы. Клинический результат наступает через 4-8 недель лечения, стойкое улучшение - после 3 месяцев лечения.

Побочное действие:

Гиперемия и шелушение кожи в месте аппликации.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно одновременное назначение с клиндамицином или бензоила пероксидом. Соблюдать осторожность при совместном применении с препаратами, оказывающими раздражающее или подсушивающее действие, и том числе с препаратами, содержащими серу, резорцинол или салициловую кислоту (возможно усиление побочного действия).

Особые указания и меры предосторожности:

При раздражении кожи прекратить использование геля (временно или совсем). Избегать пребывания на солнце; в случае длительного пребывания на солнце не наносить гель за день до этого, а также в день солнечной экспозиции и последующий день. Не рекомендуется одновременное использование косметических средств с подсушивающим и раздражающим эффектом на кожу (например, алкогольсодержащие средства).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Adapalen>