

## Адрианол



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Трамазолин](#)
- [Фенилэфрин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [Википедия](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#)  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

♦ <b>Капли назальные</b>	<b>1 мл</b>
фенилэфрина гидрохлорид	1 мг
трамазолина гидрохлорид	1.5 мг

*Вспомогательные вещества:* метилцеллюлоза М.Н.В. 10000, фенилртути (II) борат, этанол 96%, глицерол, аммиак водный, лимонной кислоты моногидрат, натрия гидрофосфата дигидрат, вода очищенная.

10 мл - флакон-капельницы пластиковые (1) - пачки картонные.

♦ <b>Капли назальные (для детей)</b>	<b>1 мл</b>
фенилэфрина гидрохлорид	500 мкг
трамазолина гидрохлорид	500 мкг

*Вспомогательные вещества:* аммиак водный, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилцеллюлоза М.Н.В. 10000, натрия гидрофосфата дигидрат, фенилртути (II) борат, этанол 96%, вода очищенная.

10 мл - флакон-капельницы пластиковые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Фенилэфрин и тримазолин являются сосудосуживающими средствами, оказывающими противоотечное действие на слизистую оболочку носа при местном применении. Уменьшение отека слизистой приводит к нормализации носового дыхания и снижению давления в придаточных пазухах носа и среднем ухе. Вязкая консистенция раствора увеличивает продолжительность действия препарата.

### Показания к применению:

Острый и хронический ринит, синусит.

Применяется в качестве вспомогательного противоотечного средства во время диагностических процедур и хирургических манипуляций.

## Относится к болезням:

- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

## Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность;
- тиреотоксикоз;
- феохромоцитомы;
- глаукома;
- тяжелые поражения почек;
- артериальная гипертензия;
- ишемическая болезнь сердца;
- атрофический ринит;
- атеросклероз.

## Способ применения и дозы:

**Взрослые и дети школьного возраста:** по 1-3 капли в каждый носовой ход 4 раза в день.

**Дети от 1 до 5 лет** (детская форма): по 2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день. **Дети грудного возраста** (детская форма): по 1 капле в каждый носовой ход за 30 минут до начала кормления.

Длительность применения препарата - не более 1 недели, затем необходим перерыв на несколько дней.

## Побочное действие:

Побочные явления возникают редко и проявляются в виде жжения, болезненности или сухости слизистой оболочки носа.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует применять одновременно с ингибиторами МАО и в течение 10 дней после окончания их применения.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять в течение длительного времени, например, при хроническом рините.

### **При нарушениях функции почек**

Адрианол нельзя применять при тяжелых поражениях почек.

### **Применение в детском возрасте**

**Дети школьного возраста:** по 1-3 капли в каждый носовой ход 4 раза в день.

**Дети от 1 до 5 лет** (детская форма): по 2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день. **Дети грудного возраста** (детская форма): по 1 капле в каждый носовой ход за 30 минут до начала кормления.

## Условия хранения:

**Адрианол**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Не использовать по истечении срока годности.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Adrianol>