Адрианол



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Трамазолин
- Фенилэфрин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли назальные***	**1 мл**
фенилэфрина гидрохлорид	1 мг
трамазолина гидрохлорид	1.5 мг

Вспомогательные вещества: метилцеллюлоза М.Н.В. 10000, фенилртути (II) борат, этанол 96%, глицерол, аммиак водный, лимонной кислоты моногидрат, натрия гидрофосфата дигидрат, вода очищенная.

10 мл - флакон-капельницы пластиковые (1) - пачки картонные.

◊ ***Капли назальные (для детей)***	**1 мл**
фенилэфрина гидрохлорид	500 мкг
трамазолина гидрохлорид	500 мкг

Вспомогательные вещества: аммиак водный, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилцеллюлоза М.Н.В. 10000, натрия гидрофосфата дигидрат, фенилртути (II) борат, этанол 96%, вода очищенная.

10 мл - флакон-капельницы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фенилэфрин и тримазолин являются сосудосуживающими средствами, оказывающими противоотечное действие на слизистую оболочку носа при местном применении. Уменьшение отека слизистой приводит к нормализации носового дыхания и снижению давления в придаточных пазухах носа и среднем ухе. Вязкая консистенция раствора увеличивает продолжительность действия препарата.

Показания к применению:

Острый и хронический ринит, синусит.

Применяется в качестве вспомогательного противоотечного средства во время диагностических процедур и хирургических манипуляций.

Относится к болезням:

- Ринит
- Синусит

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность;

— тиреотоксикоз;

— феохромоцитома;

— глаукома;

— тяжелые поражения почек;

— артериальная гипертензия;

— ишемическая болезнь сердца;

— атрофический ринит;

— атеросклероз.

Способ применения и дозы:

Взрослые и **дети школьного возраста**: по 1-3 капли в каждый носовой ход 4 раза в день.

Дети от 1 до 5 лет (детская форма): по 2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день. **Дети грудного возраста** (детская форма): по 1 капле в каждый носовой ход за 30 минут до начала кормления.

Длительность применения препарата - не более 1 недели, затем необходим перерыв на несколько дней.

Побочное действие:

Побочные явления возникают редко и проявляются в виде жжения, болезненности или сухости слизистой оболочки носа.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует применять одновременно с ингибиторами МАО и в течение 10 дней после окончания их применения.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять в течение длительного времени, например, при хроническом рините.

При нарушениях функции почек

Адрианол нельзя применять при тяжелых поражениях почек.

Применение в детском возрасте

Дети школьного возраста: по 1-3 капли в каждый носовой ход 4 раза в день.

Дети от 1 до 5 лет (детская форма): по 2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день. **Дети грудного возраста** (детская форма): по 1 капле в каждый носовой ход за 30 минут до начала кормления.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Adrianol