Аджиколд-Плюс



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения и ингаляций***	**1 г**
камфора	70 мг
ментол рацемический	60 мг
тимол	15 мг
масло эвкалиптовое эфирное	30 мг

20 г - контейнеры пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированное средство растительного происхождения с местнораздражающим, местнообезболивающим (отвлекающим), антисептическим и противовоспалительным действием.

Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные по фармакокинетике препарата отсутствуют.

Показания к применению:

Применяется в комплексной терапии:

— инфекционно-воспалительных заболеваний (в т.ч. простудных) верхних и нижних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, насморком, чувством заложенности носа;

— при мышечных болях;

— при невралгиях.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Насморк
- Невралгия

- Неврит

Противопоказания:

— склонность к бронхоспазму;

— судороги в анамнезе;

— повреждения кожных покровов в области предполагаемого нанесения препарата;

— детский возраст до 2 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: период беременности и лактации, детский возраст от 2 до 3 лет.

Способ применения и дозы:

Наружно.

При инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей: небольшое количество мази наносят 2 раза/сут на верхнюю часть груди, шеи и спины и энергично растирают. После растирания необходимо находиться в тепле.

Мышечные боли, невралгии: небольшое количество мази наносят 2 раза/сут на кожу над болезненными участками и энергично растирают. После растирания необходимо находиться в тепле.

При рините (насморке): необходимо растворить 1 чайную ложку мази в 200 мл (1 стакан) очень горячей воды и вдыхать 2 раза в день. Не нагревать во время ингаляции. Приготовленный раствор для ингаляций не использовать повторно.

Побочное действие:

Входящие в состав препарата ментол и эфирные масла могут приводить к развитию реакции гиперчувствительности, включая контактный дерматит.

При случайном приеме препарата внутрь возможно развитие таких побочных эффектов, как: тошнота, рвота, боль в животе, диарея, сонливость.

В случае возникновения вышеперечисленных симптомов рекомендуется обратиться к врачу.

Передозировка:

При наружном применении случаев передозировки не зарегистрировано.

*Симптомы при случайном приеме внутрь**:*** тошнота, рвота, спастические боли в животе, головная боль, выраженное головокружение, покраснение кожи лица, затруднение дыхания, делирий, судороги, угнетение ЦНС и кома.

Лечение: прием активированного угля, солевого слабительного и промывание желудка. Судороги можно купировать медленным внутривенным введением диазепама или, при необходимости, барбитуратов короткого действия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью: период беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сведения о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания и меры предосторожности:

Категорически запрещается наносить мазь на слизистые оболочки (в особенности носа и полости рта), на ожоговые поверхности или поврежденную кожу. Следует избегать попадания препарата в глаза.

При случайном попадании препарата в глаза или на слизистые оболочки полости носа и рта промыть холодной водой.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 2 лет.

С осторожностью: детский возраст от 2 до 3 лет

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Adzhikold-Plyus