

## [Аджисепт](#)



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [Википедия](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания** (лимонные, ананасовые, апельсиновые).

	<b>1 таб.</b>
амилметакрезол	600 мкг
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг

6 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

6 шт. - стрипы (4) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный антисептический препарат для местного применения в полости рта и глотки. Оказывает противомикробное действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

#### **Фармакокинетика**

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Аджисепт отсутствуют.

### Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки.

### Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

### Противопоказания:

## Аджисепт

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- детский возраст до 5 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Для рассасывания в полости рта. **Взрослым** назначают по 1 таблетке каждые 2 часа. *Максимальная суточная доза* - 8 таблеток. **Детям старше 5 лет** назначают по 1 таблетке каждые 4 часа. Таблетки рассасывают до полного растворения.

### Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочного действия препарата не отмечено.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Аджисепт с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

### Особые указания и меры предосторожности:

При приеме препарата Аджисепт пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать содержание сахаров в каждой таблетке: Аджисепт таблетки для рассасывания [лимонные] - 1010 мг декстрозы и 1.56 г сахарозы, Аджисепт таблетки для рассасывания [апельсиновые] - 1010 мг декстрозы и 1.56 г сахарозы; Аджисепт таблетки для рассасывания [ананасовые] - 1010 мг декстрозы и 1.56 г сахарозы.

При случайном пропуске одного или нескольких приемов дозу не повышают.

#### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 5 лет.

### Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### Срок годности:

3 года.

### Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Adzhisept>