Аджисепт



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Амилметакрезол
- Дихлорбензиловый спирт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки для рассасывания*** (лимонные, ананасовые, апельсиновые).

	1 таб.
амилметакрезол	600 мкг
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг

6 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.
6 шт. - стрипы (4) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный антисептический препарат для местного применения в полости рта и глотки. Оказывает противомикробное действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Аджисепт отсутствуют.

Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки.

Относится к болезням:

- Инфекции

Противопоказания:

— детский возраст до 5 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Для рассасывания в полости рта. **Взрослым** назначают по 1 таблетке каждые 2 часа. *Максимальная суточная доза* - 8 таблеток. **Детям старше 5 лет** назначают по 1 таблетке каждые 4 часа. Таблетки рассасывают до полного растворения.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочного действия препарата не отмечено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Аджисепт с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме препарата Аджисепт пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать содержание сахаров в каждой таблетке: Аджисепт таблетки для рассасывания [лимонные] - 1010 мг декстрозы и 1.56 г сахарозы, Аджисепт таблетки для рассасывания [апельсиновые] - 1010 мг декстрозы и 1.56 г сахарозы; Аджисепт таблетки для рассасывания [ананасовые] - 1010 мг декстрозы и 1.56 г сахарозы.

При случайном пропуске одного или нескольких приемов дозу не повышают.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 5 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Adzhisept