Аекол

Код АТХ:

- D11A

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бетакаротен
- Витамин е
- Менадион
- Ретинол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает поливитаминное, метаболическое и противоожоговое действие. Ускоряет заживление ран, стимулирует репарацию.

Показания к применению:

Трещины слизистой оболочки прямой кишки (в т.ч. состояние после иссечения трещин), геморрой; склеродермия; пролежни (декубитальные язвы), трофические и варикозные язвы; эрозия шейки матки, эндоцервицит, кольпит; гнойно-некротические раны, инфицированные ожоги II-III а ст., состояние после аутодермопластики.

Ранее применялся - неспецифический язвенный колит, проктосигмоидит; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, состояние после органосохраняющих операций ЖКТ (в т.ч. изолированная селективная проксимальная ваготомия, резекция желудка).

Относится к болезням:

- Варикоз
- Варикозные язвы
- Геморрой
- Колит
- Кольпит
- Кольпит
- Ожоги
- Проктит
- Пролежни
- Раны
- Склерит
- Склеродермия
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Местно, в проктологии - в виде микроклизм, тампонов или повязок по 30-50 мл в течение 10-12 дней; в гинекологии - в виде тампонов, смоченных раствором, курс лечения - 1-15 процедур.

Наружно, наносят через день на пораженные участки кожи (предварительно очищенные от некротических налетов) в виде масляных повязок, до появления грануляций и эпителизации.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, диарея.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aekol