

## Аэровит



### Код АТХ:

- [A11BA](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>	<b>1 таб.</b>
α-токоферола ацетат	20 мг
аскорбиновая кислота	100 мг
кальция пантотенат	10 мг
никотинамид	15 мг
пиридоксина гидрохлорид	10 мг
ретинола ацетат	6600 ME
рибофлавина мононуклеотид	2 мг
рутозид	50 мг
тиамина гидрохлорид	2 мг
фолиевая кислота	200 мкг
цианокобаламин	25 мкг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

30 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

30 шт. - банки полимерные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Фармакологическое действие Аэровита обусловлено свойствами входящих в его состав витаминов. Комплекс витаминов группы В, является составной частью ферментов, регулирующих метаболизм углеводов, жиров и белков в организме, оказывает поливитаминное, метаболическое действие.

Тиамин (витамин В<sub>1</sub>) - необходимый фактор для передачи нервного импульса во всех тканях и самой центральной

нервной системе, в качестве коэнзима участвует в углеводном обмене.

Рибофлавин (витамин В<sub>2</sub>) - катализатор процессов клеточного дыхания и перекисного окисления эндогенных веществ и ксенобиотиков, глюкуронирования.

Пиридоксин (витамин В<sub>6</sub>) - в качестве коэнзима принимает участие в метаболизме аминокислот и белков, в синтезе нейромедиаторов.

Цианкобаламин (витамин В<sub>12</sub>) вместе с фолиевой кислотой участвует в синтезе нуклеотидов, в формировании эритроцитов и клеток нервных оболочек, необходим для роста организма.

Ретинол (витамин А) - участвуя в синтезе различных веществ (белков, липидов, мукополисахаридов), в первую очередь обеспечивает нормальную функцию кожи, слизистых оболочек, а также органа зрения.

α-Токоферол (витамин Е) - является природным антиоксидантом лекарственных средств. Участвует в синтезе белков и гемоглобина, в процессах роста клеток, функции скелетных мышц, сердца и сосудов, половых желез.

Аскорбиновая кислота (витамин С) - участвует в окислении ряда биологически активных веществ, регуляции компонентов соединительной ткани, углеводного обмена, свертываемости крови и регенерации (восстановлении) тканей, стимулирует образование стероидных гормонов, нормализует проницаемость капилляров.

Рутин вместе с аскорбиновой кислотой участвует в окислительно-восстановительных процессах, обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает окисление и способствует депонированию аскорбиновой кислоты в тканях.

Никутинамид (витамин РР) - стабилизирует процессы тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена, систему метаболизма ксенобиотиков.

Кальция пантотенат - оказывает метаболическое действие. Пантотеновая кислота входит в состав коэнзима А, играя важную роль в процессах ацетилирования и окисления, участвует в углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина и стероидных гормонов. Улучшает энергетическое обеспечение сократительной функции миокарда, ускоряет процессы регенерации.

Аэровит способствует нормализации обмена веществ, оказывает тонизирующее действие, повышает умственную и физическую работоспособность.

## **Показания к применению:**

— профилактика дефицита витаминов, связанного с несбалансированным питанием у лиц, в рационе которых преобладают консервированные и сублимированные продукты;

— людям, подвергающимся воздействию экстремальных факторов (укачивание, вибрация, шум, перегрузки, пониженное барометрическое давление, поле сверхвысоких частот).

## **Относится к болезням:**

- [Укачивание](#)

## **Противопоказания:**

- детский возраст до 18 лет;
- беременность;
- кормление грудью;
- прием леводопы;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь. Для витаминизации рационов питания: 1 таблетка в сутки. При повышенных нагрузках на организм во время полетов: 2 таблетки в сутки. Курс от 2-х недель до 2-х месяцев.

## **Побочное действие:**

Аллергические реакции.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* тошнота, рвота, сонливость, бледность кожных покровов.

*Лечение:* симптоматическое.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Пиридоксин (витамин В<sub>6</sub>) уменьшает противопаркинсоническое действие леводопы, а также эффекты стероидных гормонов.

Изониазид увеличивает выведение пиридоксина с мочой.

Циклосерин, гидралазин и пенициллами являются антагонистами витамина В<sub>6</sub>.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям до 18 лет.

## **Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Aerovit>