

[Афала](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки для рассасывания** от белого до почти белого цвета, плоскоцилиндрические, с риской и фаской; на плоской стороне с риской нанесена надпись "MATERIA MEDICA", на другой плоской стороне нанесена надпись "AFALA".

антигенов к простатоспецифическому антигену аффинно очищенные (водно-спиртовая смесь активной формы действующего вещества)	1 таб. 3 мг
--	-----------------------

Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

* водно-спиртовая смесь содержит не более 10^{-15} нг/г активного вещества

20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

20 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

20 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Уменьшает явления воспаления и отека в предстательной железе, нормализует ее функциональное состояние. Улучшает уродинамику, снижает объем остаточной мочи, нормализует тонус нижних отделов мочевыводящих путей, способствует уменьшению дизурических расстройств.

Показания к применению:

— доброкачественная гиперплазия предстательной железы I и II стадии;

— в составе комплексной терапии острого и хронического простатита (в качестве противовоспалительного и обезболивающего средства);

— дизурические расстройства (частые позывы на мочеиспускание, включая ночные, затруднение при мочеиспускании, боль или дискомфорт в области промежности), в т.ч. сопровождающие доброкачественную гиперплазию предстательной железы I и II стадии острый и хронический простатит.

Относится к болезням:

- [Гиперплазия предстательной железы](#)
- [Простатит](#)

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь. На один прием 2 таблетки (держат в рту до полного растворения - не во время приема пищи). Препарат принимать 2 раза/сут, вечером и утром (до и после сна). Рекомендуемая длительность приема препарата - 16 недель.

При выраженных болевом синдроме и дизурических нарушениях в первые 2-3 недели терапии показан прием препарата до 4 раз/сут.

При необходимости по рекомендации врача возможно проведение повторного курса лечения через 1-4 мес.

Побочное действие:

При использовании препарата по указанным показаниям и в указанных дозировках побочного действия не выявлено.

Передозировка:

При случайной передозировке возможны диспептические явления, обусловленные входящими в состав лекарственной формы наполнителями.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрировано.

Особые указания и меры предосторожности:

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Afala>