# Афлубин



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Капли гомеопатические*** в виде прозрачной, от бесцветной до бесцветной со слегка желтоватым оттенком жидкости без специфического запаха.

| | **100 мл** |
|---|---|
| горечавка (Gentiana) D1 | 1 мл |
| аконит (Aconitum) D6 | 10 мл |
| бриония двудомная (Bryonia) D6 | 10 мл |
| железа фосфат (Ferrum phosphoricum) D12 | 10 мл |
| кислота молочная (Acidum sarcolacticum) D12 | 10 мл |

*Вспомогательные вещества:* этанол 43% (по массе) - 59 мл.

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

◊ ***Таблетки подъязычные гомеопатические*** белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и риской, без запаха.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| горечавка (Gentiana) D1 | 3.6 мг |
| аконит (Aconitum) D6 | 37.2 мг |
| бриония двудомная (Bryonia) D6 | 37.2 мг |
| железа фосфат (Ferrum phosphoricum) D12 | 37.2 мг |
| кислота молочная (Acidum sarcolacticum) D12 | 37.2 мг |

*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.

12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комплексный гомеопатический препарат. Оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее, жаропонижающее, дезинтоксикационное действие. Обладает противовирусной активностью. Способствует повышению активности неспецифических факторов местного иммунитета. Уменьшает интенсивность и длительность интоксикационного и катарального синдромов, нормализует функции слизистой оболочки дыхательных путей.

***Фармакокинетика***

Действие препарата Афлубин является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

## Показания к применению:

— лечение и профилактика (плановая и экстренная) гриппа, парагриппа и других ОРЗ с целью облегчения симптомов (в составе комплексной терапии);

— лечение воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом.

## Относится к болезням:

- Болевой синдром
- Грипп
- Ревматизм
- Ревматические заболевания

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

При *гриппе и ОРЗ (1-2 день заболевания)* **детям до 1 года** назначают по 1/2 таб. или 1 кап., **детям 1-12 лет** - 1/2 таб. или 5 кап., **взрослым и подросткам** - 1 таб. или 10 кап.. Кратность приема - не более 3-8 раз/сут.

При *гриппе и ОРЗ (развернутая стадия)* **детям до 1 года** назначают по 1/2 таб. или 1 кап., **детям 1-12 лет** - 1/2 таб. или 5 кап., **взрослым и подросткам** - 1 таб. или 10 кап.. Кратность приема - 3 раза/сут в течение 5-10 дней.

Для *плановой профилактики гриппа* в начале холодного времени года или за 1 мес до ежегодно ожидаемого пика заболеваемости **детям до 1 года** назначают по 1/2 таб. или 1 кап., **детям 1-12 лет** - 1/2 таб. или 5 кап., **взрослым и подросткам** - 1 таб. или 10 кап.. Кратность приема - 2 раза/сут. Продолжительность курса - 3 недели.

Для *экстренной профилактики гриппа и ОРЗ* сразу же после контакта с заболевшим или после сильного переохлаждения **детям до 1 года** назначают по 1/2 таб. или 1 кап., **детям 1-12 лет** - 1/2 таб. или 5 кап., **взрослым и подросткам** - 1 таб. или 10 кап.. Кратность приема - 2 раза/сут. Продолжительность курса - 2 дня.

Для *лечения воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом,* **детям 1-12 лет** - 1/2 таб. или 5 кап., **взрослым и подросткам** - 1 таб. или 10 кап. Кратность приема - 3-8 раз/сут в начале лечения (1-2 день), в дальнейшем - 3 раза/сут в течение 1 мес.

В *начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов,* возможен прием препарата каждые 0.5-1 ч по 8-10 кап., но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут.

Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 стол. л. воды. Детям до 1 года капли разводят в 1 чайн. л. воды или материнского молока. 1/2 таб. также следует растворить в 1 чайн. л. воды или материнского молока и давать по 1 кап. Перед проглатыванием рекомендуется задержать препарат во рту на некоторое время. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

## Побочное действие:

*Редко:* повышенное слюноотделение.

Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

## Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата Афлубин при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата Афлубин с другими лекарственными средствами не установлено.

## Особые указания и меры предосторожности:

Поскольку препарат Афлубин в форме капель гомеопатических содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

***Применение в детском возрасте***

Препарат применяется у детей (см. Режим дозирования).

## Условия хранения:

Препарат в форме таблеток подъязычных следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света, недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Препарат в форме капель гомеопатических следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей. Срок годности - 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Aflubin