

Афлубин



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Капли гомеопатические** в виде прозрачной, от бесцветной до бесцветной со слегка желтоватым оттенком жидкости без специфического запаха.

	100 мл
горечавка (Gentiana) D1	1 мл
аконит (Aconitum) D6	10 мл
бриония двудомная (Bryonia) D6	10 мл
железа фосфат (Ferrum phosphoricum) D12	10 мл
кислота молочная (Acidum sarcolacticum) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% (по массе) - 59 мл.

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

♦ **Таблетки подъязычные гомеопатические** белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и риской, без запаха.

	1 таб.
горечавка (Gentiana) D1	3.6 мг
аконит (Aconitum) D6	37.2 мг
бриония двудомная (Bryonia) D6	37.2 мг
железа фосфат (Ferrum phosphoricum) D12	37.2 мг
кислота молочная (Acidum sarcolacticum) D12	37.2 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.

12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

12 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

12 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат. Оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее, жаропонижающее, дезинтоксикационное действие. Обладает противовирусной активностью. Способствует повышению активности неспецифических факторов местного иммунитета. Уменьшает интенсивность и длительность интоксикационного и катарального синдромов, нормализует функции слизистой оболочки дыхательных путей.

Фармакокинетика

Действие препарата Афлубин является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

- лечение и профилактика (плановая и экстренная) гриппа, парагриппа и других ОРЗ с целью облегчения симптомов (в составе комплексной терапии);
- лечение воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом.

Относится к болезням:

- [Болевой синдром](#)
- [Грипп](#)
- [Ревматизм](#)
- [Ревматические заболевания](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При гриппе и ОРЗ (1-2 день заболевания) **детям до 1 года** назначают по 1/2 таб. или 1 кап., **детям 1-12 лет** - 1/2 таб. или 5 кап., **взрослым и подросткам** - 1 таб. или 10 кап.. Кратность приема - не более 3-8 раз/сут.

При гриппе и ОРЗ (развернутая стадия) **детям до 1 года** назначают по 1/2 таб. или 1 кап., **детям 1-12 лет** - 1/2 таб. или 5 кап., **взрослым и подросткам** - 1 таб. или 10 кап.. Кратность приема - 3 раза/сут в течение 5-10 дней.

Для плановой профилактики гриппа в начале холодного времени года или за 1 мес до ежегодно ожидаемого пика заболеваемости **детям до 1 года** назначают по 1/2 таб. или 1 кап., **детям 1-12 лет** - 1/2 таб. или 5 кап., **взрослым и подросткам** - 1 таб. или 10 кап.. Кратность приема - 2 раза/сут. Продолжительность курса - 3 недели.

Для экстренной профилактики гриппа и ОРЗ сразу же после контакта с заболевшим или после сильного переохлаждения **детям до 1 года** назначают по 1/2 таб. или 1 кап., **детям 1-12 лет** - 1/2 таб. или 5 кап., **взрослым и подросткам** - 1 таб. или 10 кап.. Кратность приема - 2 раза/сут. Продолжительность курса - 2 дня.

Для лечения воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом, **детям 1-12 лет** - 1/2 таб. или 5 кап., **взрослым и подросткам** - 1 таб. или 10 кап. Кратность приема - 3-8 раз/сут в начале лечения (1-2 день), в дальнейшем - 3 раза/сут в течение 1 мес.

В начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата каждые 0.5-1 ч по 8-10 кап., но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут.

Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 стол. л. воды. Детям до 1 года капли разводят в 1 чайн. л. воды или материнского молока. 1/2 таб. также следует растворить в 1 чайн. л. воды или материнского молока и давать по 1 кап. Перед проглатыванием рекомендуется задержать препарат во рту на некоторое время. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

Побочное действие:

Редко: повышенное слюноотделение.

Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата Афлубин при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата Афлубин с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Поскольку препарат Афлубин в форме капель гомеопатических содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в детском возрасте

Препарат применяется у детей (см. Режим дозирования).

Условия хранения:

Препарат в форме таблеток подъязычных следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света, недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Препарат в форме капель гомеопатических следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей. Срок годности - 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Aflubin>