

## Африн увлажняющий



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Оксиметазолин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Спрей назальный 0.05%** в виде гелеобразной суспензии белого или почти белого цвета, с характерным цитрусовым запахом.

	<b>1 мл</b>
оксиметазолина гидрохлорид	500 мкг

*Вспомогательные вещества:* динатрия эдетата дигидрат - 300 мкг, натрия гидрофосфат - 975 мкг, натрия дигидрофосфата моногидрат - 5.525 мг, повидон K29-32 - 30 мг, бензалкония хлорида раствор 17% - 1.471 мг, макрогол 1450 - 50 мг, бензиловый спирт - 2.5 мг, целлюлоза микрокристаллическая и кармеллоза натрия (авицел RC-591) - 30 мг, ароматизатор лимонный - 1.5 мг, вода очищенная - q.s. до 1 мл.

15 мл - флаконы пластиковые с дозирующим устройством (1) - пачки картонные.

### Африн увлажняющий

◇ **Спрей назальный 0.05%** в виде гелеобразной суспензии белого или почти белого цвета, с характерным цитрусовым запахом.

	<b>1 мл</b>
оксиметазолина гидрохлорид	500 мкг

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая и кармеллоза натрия (авицел RC-591) - 30 мг, натрия гидрофосфат - 975 мкг, натрия дигидрофосфата моногидрат - 5.525 мг, динатрия эдетата дигидрат - 300 мкг, макрогол 1450 - 50 мг, повидон K29-32 - 30 мг, бензиловый спирт - 2.5 мг, ароматизатор лимонный - 1.5 мг, бензалкония хлорида раствор 17% - 1.471 мг, глицерол - 5 мг, вода очищенная - q.s. до 1 мл.

15 мл - флаконы пластиковые с дозирующим устройством (1) - пачки картонные.

### Африн экстро

## Африн увлажняющий

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

◇ **Спрей назальный 0.05%** в виде гелеобразной суспензии белого или почти белого цвета, с характерным запахом.

	<b>1 мл</b>
оксиметазолина гидрохлорид	500 мкг

**Вспомогательные вещества:** целлюлоза микрокристаллическая и кармеллоза натрия (авицел RC-591) - 30 мг, натрия гидрофосфат - 975 мкг, натрия дигидрофосфата моногидрат - 5.525 мг, динатрия эдетата дигидрат - 300 мкг, макрогол 1450 - 50 мг, повидон K29-32 - 30 мг, бензиловый спирт - 3 мг, цинеол - 200 мкг, камфора - 200 мкг, левоментол - 600 мкг, бензалкония хлорида раствор 17% - 1.471 мг, полипропиленгликоль - 5 мг, вода очищенная - q.s. до 1 мл.

15 мл - флаконы пластиковые с дозирующим устройством (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Сосудосуживающий препарат для местного применения, альфа-адреностимулятор. Оксиметазолин вызывает сужение сосудов слизистых оболочек носа, придаточных пазух и евстахиевой трубы, что приводит к снижению их отека и облегчению носового дыхания при аллергическом и/или инфекционно-воспалительном рините (насморке).

За счет наличия в составе спрея назального вспомогательных веществ (целлюлозы микрокристаллической и кармеллозы натрия и повидона-K29-32) лекарственный препарат не вытекает из носа и не стекает в горло, т.к. после введения в носовые ходы спрей становится более вязким и удерживается на слизистых оболочках носа более эффективно, чем стандартный водный раствор.

Африн увлажняющий содержит увлажняющие вещества (глицерол и макрогол-1450), способствующие удержанию влаги, что помогает обеспечить увлажнение сухой или раздраженной слизистой оболочки носа.

На основании опубликованных клинических исследований интраназальное введение ароматической композиции, аналогичной составу препарата Африн экстро, содержащему левоментол (известный также под названием ментол), цинеол (также известный под названием эвкалипт) и камфору, вызывает временное ощущение охлаждения слизистой оболочки носа в результате взаимодействия с холодowymi рецепторами тройничного нерва на поверхности слизистой оболочки.

По данным клинических исследований препарат начинает действовать в течение 1 мин, действие продолжается до 12 ч.

### Фармакокинетика

При применении в виде назального спрея оксиметазолин практически не определяется в плазме крови.

## Показания к применению:

- симптоматическая терапия ринита (насморка) аллергической и/или инфекционно-воспалительной этиологии
- синусит;
- евстахиит;
- сенная лихорадка.

## Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Евстахиит](#)
- [Инфекции](#)
- [Лихорадка](#)
- [Насморк](#)
- [Ринит](#)
- [Сенная лихорадка](#)
- [Синусит](#)

## Противопоказания:

- атрофический ринит;
- одновременное применение ингибиторов MAO (включая период 14 дней после их отмены);

- детский возраст до 6 лет.
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к симпатомиметическим средствам.

*С осторожностью:* заболевание коронарных артерий, аритмии, хроническая сердечная недостаточность, выраженный атеросклероз, артериальная гипертензия, гипертиреоз, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы с клиническими симптомами, беременность, период лактации.

## Способ применения и дозы:

Интраназально.

Перед каждым использованием необходимо энергично встряхивать флакон.

Перед первым применением назального спрея необходимо провести его "калибровку" путем нажатия на головку распылителя несколько раз.

**Взрослым и детям старше 6 лет** - по 2-3 впрыскивания в каждый носовой ход с интервалом 10-12 ч. У **взрослых** кратность применения можно увеличить до 3 раз/сут у взрослых. Не рекомендуется превышать указанную дозу.

## Побочное действие:

В целом, лекарственный препарат хорошо переносится, и возможные побочные реакции обычно легкой степени и преходящие.

*Местные реакции:* преходящая сухость и жжение слизистой оболочки полости носа, сухость во рту и горле, чиханье. При длительном применении - тахифилаксия, реактивная гиперемия и атрофия слизистой оболочки полости носа. Бензалкония хлорид, входящий в состав препарата, может вызвать локальные кожные реакции.

*Системные реакции:* повышение АД, повышенная тревожность, тошнота, головокружение, головная боль, бессонница, сердцебиение, нарушения сна.

## Передозировка:

*Симптомы:* при значительной передозировке или случайном приеме внутрь возможны тошнота, рвота, цианоз, лихорадка, тахикардия, аритмия, повышение АД, одышка, психические расстройства, угнетение ЦНС (сонливость, снижение температуры тела, брадикардия, снижение АД, остановка дыхания и кома).

*Лечение:* симптоматическое; при случайном приеме внутрь - промывание желудка, активированный уголь. Вазопрессорные лекарственные препараты противопоказаны.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность препарата у беременных женщин и в период лактации не установлена, поэтому препарат следует назначать при беременности и в период грудного вскармливания только по рекомендации врача в случае, если ожидаемая польза от применения препарата для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат замедляет всасывание местноанестезирующих лекарственных средств, удлиняет время их действия.

Совместное применение с другими сосудосуживающими лекарственными средствами повышает риск развития побочных эффектов.

При одновременном применении ингибиторов MAO (включая период 14 дней после их отмены), мапротилина и трициклических антидепрессантов - повышение АД.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При продолжительном применении (более одной недели) возможно возобновление симптомов заложенности носа.

При необходимости продолжения лечения более 5 дней следует проконсультироваться с врачом.

Необходимо избегать попадания препарата в глаза.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат при правильном применении и в рекомендуемых дозах не оказывает влияния на вождение автотранспорта и работу с механизмами, однако при возникновении таких побочных эффектов, как головокружение, пациент должен воздержаться от данных видов деятельности.

### **При нарушениях функции почек**

*С осторожностью:* хроническая почечная недостаточность.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказание: детский возраст до 6 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Afrin\\_uvlazhnyayushchiy](http://drugs.thead.ru/Afrin_uvlazhnyayushchiy)