

[Акридерм СК](#)



Код АТХ:

- [D07XC01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бетаметазон](#)
- [Салициловая кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Мазь для наружного применения** от белого до белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета; допускается наличие слабого специфического запаха.

	1 г
бетаметазона дипропионат	640 мкг
салициловая кислота	30 мг

Вспомогательные вещества: вазелин, масло вазелиновое.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинация ГКС с антисептическим средством, обладающим кератолитическим действием.

Показания к применению:

Мазь Акридерм СК применяют для терапии подострых и хронических дерматозов, чувствительных к наружной кортикостероидной терапии, сопровождающихся гиперкератозом:

- псориаз;
- атопический дерматит (нейродермит);
- красный плоский лишай;
- экзема;
- дисгидратический дерматит;
- ихтиоз и ихтиозоформные изменения.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Ихтиоз](#)
- [Кератит](#)
- [Лишай](#)
- [Нейродермит](#)
- [Псориаз](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность к любому компоненту препарата;
- туберкулез кожи;
- вирусные инфекции кожи;
- вакцинация;
- периоральный дерматит;
- розовые угри (розацеа).

Способ применения и дозы:

Препарат Акридерм СК наносят тонким слоем на воспаленную поверхность 2 раза/сут, слегка втирая. В более легких случаях достаточно однократного использования.

Продолжительность лечения, как правило, ограничивается 3 неделями. При необходимости длительного курса терапии рекомендуется препарат использовать реже, например, через день. При терапии хронических заболеваний под постоянным наблюдением врача лечение следует продолжать еще некоторое время после исчезновения всех симптомов, чтобы избежать рецидива заболевания.

Применение препарата у **детей младше 12 лет** проводится под наблюдением лечащего врача.

Побочное действие:

Побочные явления могут носить как локальный (на месте применения), так и системный характер (следствие системного всасывания активных компонентов). В месте применения может развиваться чувство жжения, зуд, фолликулит, акне, стрии, атрофия кожи, депигментация и гипертрихоз.

Очень редко при длительном применении на больших поверхностях кожных покровов, при использовании окклюзионных повязок возможно усиленное чрескожное всасывание активных компонентов препарата, которое

может вызвать системные побочные явления, проявляющиеся в виде симптомов передозировки ГКС (задержка роста, обратимое подавление системы АКТГ, синдром Кушинга, доброкачественное повышение внутричерепного давления после окончания лечения, гипергликемия, гликозурия, гипокалиемия, повышение АД); побочные явления, вызываемые салицилатами: бледность, утомляемость, сонливость, гипервентиляция и тахипноэ, тошнота, рвота, нарушения слуха, спутанность сознания и т.п.

В случае возникновения побочных явлений необходимо обратиться к врачу.

В случае развития вторичной инфекции кожи следует применять адекватную противогрибковую и антибактериальную терапию. Не применяйте противогрибковых и антибактериальных препаратов самостоятельно! Проконсультируйтесь с врачом!

Передозировка:

Если Акридерм СК мазь наносят на большие поверхности воспаленной, а поэтому обладающей большей проницаемостью кожи, в течение длительного периода (больше 3 недель), с использованием окклюзионной повязки, а так же при длительном применении у детей не исключено усиленное всасывание активных компонентов и проявление системных эффектов бетаметазона и салициловой кислоты.

В случае передозировки применение препарата следует прекратить и обратиться к лечащему врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение мази Акридерм СК у беременных допускается только в тех случаях, когда по оценке лечащего врача, предполагаемая польза для беременной превышает возможный риск для плода. В таких случаях применение препарата должно быть непродолжительным и ограничиваться небольшими поверхностями кожных покровов.

По решению лечащего врача женщины могут применять Акридерм СК мазь в период грудного вскармливания. При этом следует избегать длительного применения на большой поверхности кожных покровов. Нельзя наносить препарат на кожу молочной железы перед кормлением.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не отмечено клинически достоверных взаимодействий с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Мазь Акридерм® СК предназначена только для наружного применения на коже. Препарат нельзя наносить на кожу вблизи глаз. Не рекомендуется длительное применение на коже лица в связи с возможным развитием дерматита по типу розацеа, периорального дерматита, атрофии кожи и акне. Следует избегать применения препарата в аногенитальной области.

Применение в детском возрасте

Применение препарата у детей младше 12 лет проводится под наблюдением лечащего врача.

Применение мази Акридерм СК у детей должно быть как можно менее продолжительным при соблюдении строжайших мер предосторожности, так как у детей существует опасность системного всасывания пропорционального большего количества активных компонентов из-за преобладания площади кожных покровов над массой тела и недостаточной зрелости эпидермиса.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15 до 25°C.

Препарат нельзя использовать после истечения срока годности, обозначенного на упаковке!

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Akriderm_Sk