Актипол



Код АТХ:

- S03D

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аминобензойная кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Капли глазные 0.007%*** прозрачные, бесцветные или слегка желтоватые.

	1 мл
пара-аминобензойная кислота	70 мкг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода очищенная - до 1 мл.

5 мл - флаконы-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — иммуномодулирующее, антиоксидантное, противовирусное.

Является индуктором эндогенного интерферона, что объясняет один из механизмов специфического антивирусного действия. Оказывает радиопротекторное действие, регулирует водно-солевой баланс, стимулирует процессы регенерации роговицы, не обладает тератогенным, мутагенным, эмбриотоксическим действием..

Фармакодинамика

Противовирусный и иммуномодулирующий препарат для местного применения. Индуктор синтеза эндогенного интерферона. Оказывает антиоксидантное, иммуномодулирующее и радиопротекторное действие, ускоряет регенерацию роговицы.

Фармакокинетика

Всасывание и распределение

При инстилляции в конъюнктивальный мешок аминобензойная кислота быстро всасывается в ткани переднего отрезка глаза, где оказывает терапевтическое действие. C_{max} лекарственного вещества в плазме достигается через 30 мин (14±7.9 мкг/мл) при системном введении.

Выведение

$T_{1/2}$ лекарственного вещества - 10.9±1.03 мин, Выводится через кишечник и почками.

Показания к применению:

В качестве монотерапии и в составе комплексной терапии при:

— вирусных конъюнктивитах, кератоконъюнктивитах и кератоувеитах, вызываемых вирусом герпеса (Herpes simplex, Herpes zoster), аденовирусами;

— кератопатиях инфекционного, посттравматического и послеоперационного генеза;

— дистрофических заболеваниях сетчатки и роговицы;

— ожогах и травмах глаза;

— для сокращения сроков адаптации к контактным линзам, улучшения их переносимости, устранения дискомфорта, связанного с длительным ношением контактных линз;

— синдроме сухого глаза.

Относится к болезням:

- Герпес
- Инфекции
- Кератит
- Кератоконус
- Конъюнктивит
- Травмы

Противопоказания:

— индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

У **взрослых и детей** при *вирусных поражениях глаз в острой стадии заболевания* препарат закапывают в конъюнктивальную полость по 1-2 капли 6-8 раз/сут; после клинического выздоровления препарат закапывают 3 раза/сут в течение 3-5 дней.

При *дистрофических заболеваниях роговицы и сетчатки* препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 3-4 раза/сут в течении 1 месяца с 3-месячными перерывами.

При *синдроме сухого глаза* препарат применяют ежедневно, по 1-2 капли 3 раза/сут в течение 3-4 недель до исчезновении симптомов заболевания. С *профилактической целью* - по 1-2 капли 3 раза/сут в течение 2 недель с 1.5-2-месячными перерывами.

Побочное действие:

Местные реакции: редко - аллергические реакции.

Передозировка:

При местном применении препарата случаи передозировки не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания по применению в период беременности и лактации не выявлены.

Препарат не обладает тератогенным, мутагенным, эмбриотоксическим действием.

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза превышает возможный риск. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В комбинации с аналогами нуклеозидов (ацикловир, ганцикловир), противомикробными средствами (фторхинолоны) и антибиотиками (полимиксин В) усиливается терапевтическое действие этих препаратов.

Не следует применять Актипол одновременно с сульфаниламидными препаратами (сульфацил-натрий).

Особые указания и меры предосторожности:

Использование в педиатрии

Применение препарата у **детей** возможно, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет на способность управлять транспортными средствами.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от -18°С до 40°С. Срок годности – 2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

После вскрытия флакона-капельницы препарат следует использовать в течение 14 суток.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aktipol