

Актовегин (гель)



Код АТХ:

- [B06AB](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения 20%** однородный, бесцветный или желтоватого цвета, прозрачный.

	100 г
компоненты крови - депротенинизированный гемодериват из крови телят	20 мл,
что соответствует содержанию сухой массы	800 мг

Вспомогательные вещества: кармеллоза натрия - 1.80 г, пропиленгликоль - 2.00 г, кальция лактат - 0.30 г, метилпарагидроксибензоат - 0.175 г, пропилпарагидроксибензоат - 0.025 г, вода очищенная - 94.90 г.

20 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
100 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Актовегин - антигипоксанта, активизирует метаболизм глюкозы и кислорода.

Актовегин вызывает увеличение клеточного энергетического метаболизма. Его активность подтверждается увеличением потребления и повышением утилизации глюкозы и кислорода клетками. Эти два эффекта сопряжены, они вызывают увеличение метаболизма АТФ и, следовательно, повышают энергетический обмен. Результатом этого является стимулирование и ускорение процесса заживления, характеризующегося повышенным потреблением энергии.

Показания к применению:

Актовегин (гель)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- раны и воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек: ожоги (в т.ч. солнечные), порезы кожи, ссадины, царапины, трещины;
- с целью улучшения регенерации ткани после ожогов, в т.ч. после ожога кипящей жидкостью или паром;
- в качестве начальной терапии мокнущих язв;
- для профилактики и лечения реакций со стороны кожи и слизистых, обусловленных воздействием радиации;
- для предварительной обработки раневых поверхностей перед трансплантацией кожи при лечении ожоговой болезни.

Относится к болезням:

- [Ожоги](#)
- [Порезы](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Царапины](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность к препарату Актовегин или аналогичным препаратам.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Гель наносится тонким слоем на пораженные участки несколько раз в день. Для очищения язвенных поверхностей наносится толстый слой геля и закрывается компрессом с 5% мазью Актовегин или марлевой повязкой, пропитанной мазью. Повязку меняют один раз в сутки, при лечении сильно мокнущих поверхностей - несколько раз в сутки. В дальнейшем лечение следует продолжить Актовегин 5% в форме крема или Актовегином 5% в форме мази.

Побочное действие:

Обычно препарат переносится хорошо.

В начале лечения препаратом Актовегин 20% гель могут возникнуть местные болевые ощущения, связанные с местным отеком тканей. Однако это не является свидетельством непереносимости препарата. В случае, если болевые ощущения сохраняются или ожидаемый эффект от препарата не достигнут, следует обратиться к врачу.

У пациентов, имеющих в анамнезе реакции гиперчувствительности, в редких случаях могут развиваться аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и лактации допускается.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами в настоящее время неизвестно.

Условия хранения:

Препарат хранить в месте, недоступном для детей при температуре не выше 25°C.

Не использовать по истечении срока годности.

Актовегин (гель)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aktovegin_gel