

[Актовегин \(крем\)](#)



Код АТХ:

- [B06AB](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Крем для наружного применения 5%** однородный, белого цвета.

	100 г
компоненты крови - депротеинизированный гемодериват крови телят	5 мл,
что соответствует содержанию сухой массы	200 мг

Вспомогательные вещества: макрогол 400 - 76.0 г, макрогол 4000 - 13.0 г, цетиловый спирт - 2.5 г, глицерил моностеарат - 3.0 г, бензалкония хлорид - 0.02 г, вода очищенная - 5.28 г.

20 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
100 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Актовегин - антигипоксанта, активирует метаболизм глюкозы и кислорода.

Актовегин вызывает увеличение клеточного энергетического метаболизма. Его активность подтверждается увеличением потребления и повышением утилизации глюкозы и кислорода клетками. Эти два эффекта сопряжены, они вызывают увеличение метаболизма АТФ и, следовательно, повышают энергетический обмен. Результатом этого является стимулирование и ускорение процесса заживления, характеризующегося повышенным потреблением энергии.

Показания к применению:

Актовегин (крем)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- раны и воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек, такие, как: ожоги, в т.ч. солнечные, порезы кожи, ссадины, царапины;
- с целью улучшения регенерации ткани после ожогов, в т.ч. после ожога кипящей жидкостью или паром;
- язвы варикозного происхождения или другие мокнущие язвы;
- для профилактики и лечения пролежней;
- для профилактики и лечения реакций со стороны кожи и слизистых, обусловленных воздействием радиации.

Относится к болезням:

- [Варикоз](#)
- [Мокнущие язвы](#)
- [Ожоги](#)
- [Порезы](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Царапины](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность к препарату Актовегин или аналогичным препаратам.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Курс лечения составляет не менее 12 дней и продолжается на протяжении всего периода активной регенерации. Кратность применения - не менее 2 раз/сут.

Язвы: после первоначальной терапии Актовегином 20% в форме геля наносят Актовегин 5% крем тонким слоем.

Для профилактики пролежней: крем втирают в кожу в зонах повышенного риска.

С целью профилактики возникновения радиационных поражений: Актовегин 5% крем наносят тонким слоем непосредственно после радиационной терапии и в интервалах между сеансами.

В случае отсутствия или недостаточности эффекта от применения Актовегина 5% в форме крема следует обратиться к врачу.

Побочное действие:

Обычно препарат переносится хорошо.

У пациентов, имеющих в анамнезе реакции гиперчувствительности, в редких случаях могут развиваться аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и лактации допускается.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время неизвестно.

Условия хранения:

Актовегин (крем)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат хранить в месте, недоступном для детей при температуре не выше 25°C.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aktovegin_krem