Актовегин (крем)



Код АТХ:

- B06AB

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения 5%*** однородный, белого цвета.

	100 г
компоненты крови - депротеинизированный гемодериват крови телят	5 мл,
что соответствует содержанию сухой массы	200 мг

Вспомогательные вещества: макрогол 400 - 76.0 г, макрогол 4000 - 13.0 г, цетиловый спирт - 2.5 г, глицерил моностеарат - 3.0 г, бензалкония хлорид - 0.02 г, вода очищенная - 5.28 г.

20 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
100 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Актовегин - антигипоксант, активирует метаболизм глюкозы и кислорода.

Актовегин вызывает увеличение клеточного энергетического метаболизма. Его активность подтверждается увеличением потребления и повышением утилизации глюкозы и кислорода клетками. Эти два эффекта сопряжены, они вызывают увеличение метаболизма АТФ и, следовательно, повышают энергетический обмен. Результатом этого является стимулирование и ускорение процесса заживления, характеризующегося повышенным потреблением энергии.

Показания к применению:

— раны и воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек, такие, как: ожоги, в т.ч. солнечные, порезы кожи, ссадины, царапины;

— с целью улучшения регенерации ткани после ожогов, в т.ч. после ожога кипящей жидкостью или паром;

— язвы варикозного происхождения или другие мокнущие язвы;

— для профилактики и лечения пролежней;

— для профилактики и лечения реакций со стороны кожи и слизистых, обусловленных воздействием радиации.

Относится к болезням:

- Варикоз
- Мокнущие язвы
- Ожоги
- Порезы
- Пролежни
- Раны
- Ссадины
- Царапины

Противопоказания:

— гиперчувствительность к препарату Актовегин или аналогичным препаратам.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Курс лечения составляет не менее 12 дней и продолжается на протяжении всего периода активной регенерации. Кратность применения - не менее 2 раз/сут.

Язвы: после первоначальной терапии Актовегином 20% в форме геля наносят Актовегин 5% крем тонким слоем.

Для профилактики пролежней: крем втирают в кожу в зонах повышенного риска.

С целью профилактики возникновения радиационных поражений: Актовегин 5% крем наносят тонким слоем непосредственно после радиационной терапии и в интервалах между сеансами.

В случае отсутствия или недостаточности эффекта от применения Актовегина 5% в форме крема следует обратиться к врачу.

Побочное действие:

Обычно препарат переносится хорошо.

У пациентов, имеющих в анамнезе реакции гиперчувствительности, в редких случаях могут развиваться аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и лактации допускается.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время неизвестно.

Условия хранения:

Препарат хранить в месте, недоступном для детей при температуре не выше 25°С.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aktovegin_krem