

[Актовегин \(мазь\)](#)



Код АТХ:

- [B06AB](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения 5%** однородная, белого цвета.

	100 г
депротеинизированный гемодериват из крови телят	5 мл,
что соответствует содержанию сухой массы	200 мг

Вспомогательные вещества: парафин белый - 66.0 г, холестерол (холестерин) - 0.10 г, цетиловый спирт - 3.50 г, метилпарагидроксibenзоат - 0.16 г, пропилпарагидроксibenзоат - 0.02 г, вода очищенная - 30.02 г.

20 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
100 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Актовегин - антигипоксанта, активизирует метаболизм глюкозы и кислорода.

Актовегин вызывает увеличение клеточного энергетического метаболизма. Его активность подтверждается увеличением потребления и повышением утилизации глюкозы и кислорода клетками. Эти два эффекта сопряжены, они вызывают увеличение метаболизма АТФ и, следовательно, повышают энергетический обмен. Результатом этого является стимулирование и ускорение процесса заживления, характеризующегося повышенным потреблением энергии.

Показания к применению:

Актовегин (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- раны и воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек, такие, как: солнечные, термические, химические ожоги в острой стадии, порезы кожи, ссадины, царапины, трещины;
- с целью улучшения регенерации ткани после ожогов, в т.ч. после ожога кипящей жидкостью или паром;
- язвы варикозного происхождения или другие мокнущие язвы;
- для профилактики и лечения пролежней;
- для профилактики и лечения реакций со стороны кожи и слизистых, обусловленных воздействием радиации.

Относится к болезням:

- [Варикоз](#)
- [Мокнущие язвы](#)
- [Порезы](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Царапины](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность к препарату Актовегин или аналогичным препаратам.

Способ применения и дозы:

Курс лечения составляет не менее 12 дней и продолжается на протяжении всего периода активной регенерации. Кратность применения - не менее 2 раз/сут.

Язвы, раны и воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек: как правило, в качестве последнего звена в поэтапном «трехступенчатом лечении» с применением Актовегина 20% в форме геля и 5% крема, Актовегин 5% мазь наносится тонким слоем.

Для профилактики пролежней мазь втирают в кожу в зонах повышенного риска.

С целью профилактики возникновения радиационных поражений Актовегин 5% мазь наносят тонким слоем непосредственно после радиационной терапии и в интервалах между сеансами.

В случае отсутствия или недостаточности эффекта от применения Актовегина 5% в форме мази, следует обратиться к врачу.

Побочное действие:

Обычно препарат переносится хорошо.

У пациентов, имеющих в анамнезе реакции гиперчувствительности, в редких случаях могут развиваться аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и лактации допускается.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время неизвестно.

Условия хранения:

Актовегин (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aktovegin_maz