Альбетор



Код АТХ:

- C07AG

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для в/в введения прозрачный, бесцветный или слегка окрашенный.

	1 мл	**1 амп.**
бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола гидрохлорид (проксодолол)	10 мг	50 мг

Вспомогательные вещества: лимонная кислота, натрия цитрат д/и, вода д/и.

5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
5 мл - ампулы стеклянные (10) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 мл - ампулы стеклянные (10) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
5 мл - ампулы стеклянные (10) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Неселективный альфа- и бета-адреноблокатор. Оказывает антигипертензивное, антиангинальное и антиаритмическое действие, относится к антиаритмикам класса II. Замедляет ЧСС, расширяет сосуды, снижает ОПСС и уменьшает минутный объем крови.

В связи с блокадой β-адренорецепторов повышается тонус бронхов.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Альбетор не предоставлены.

Показания к применению:

— гипертонический криз (купирование).

Относится к болезням:

- Гипертонический криз
- Гипертония

Противопоказания:

— выраженная брадикардия;

— AV-блокада II и III степени;

— хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;

— кардиогенный шок;

— артериальная гипотензия;

— ХОБЛ;

— бронхиальная астма;

— одновременный прием ингибиторов МАО;

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание);

— возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не изучены);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять при AV-блокаде I степени, хронической сердечной недостаточности, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарном диабете 1 типа (инсулинзависимом).

Способ применения и дозы:

Препарат вводят в/в струйно или капельно.

В/в струйно вводят в дозе 10-20 мг (1-2 мл раствора, содержащего 10 мг/мл) в течение 1 мин. При необходимости повторяют введение с интервалом 5 мин до развития эффекта. Максимальная доза - 50-100 мг (5-10 мл раствора, содержащего 10 мг/мл).

В/в капельно вводят в дозе 50 мг (5 мл 1% раствора, содержащего 10 мг/мл) в 200 мл изотонического (0.9%) раствора натрия хлорида или 5% растворе декстрозы (глюкозы) со скоростью 0.5 мг (2 мл инфузионного раствора) в мин до получения положительной реакции.

Побочное действие:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, чрезмерное снижение АД, похолодание конечностей, блокада ножек пучка Гиса, AV-блокада.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, сухость во рту, гастралгия.

Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль.

Аллергические реакции: местная или генерализованная экзантема, крапивница.

Прочие: слабость, бронхоспазм, повышение сократимости миометрия.

Передозировка:

Симптомы: выраженное снижение АД, брадикардия (проходит через 10-20 мин после прекращения введения), желудочковая экстрасистолия, усиление симптомов сердечной недостаточности, бронхоспазм.

Лечение: перевести больного в положение с приподнятыми вверх ногами, проведение оксигенотерапии. При брадикардии - атропина сульфат или добутамин в/в, возможно в/в введение глюкагона или эпинефрина, проведение трансвенозной электрокардиостимуляции.

При выраженном снижении АД - в/в введение плазмозамещающих растворов (при отсутствии отека легких) и под контролем АД - сосудосуживающих средств (эпинефрин, норэпинефрин, допамин или добутамин). При бронхоспазме - изопреналин и теофиллин. При сердечной недостаточности - сердечные гликозиды и/или глюкагон и диуретики. При желудочковой экстрасистолии - лидокаин или фенитоин.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Альбетора с сердечными гликозидами, метилдопой, резерпином и гуанфацином, блокаторами медленных кальциевых каналов (верапамил, дилтиазем), амиодароном и другими антиаритмическими средствами повышается риск развития или усугубления брадикардии, AV-блокады, возможна остановка сердца.

При одновременном применении препарата с нифедипином, диуретиками, клонидином, симпатолитиками, гидралазином и другими антигипертензивными средствами возможно чрезмерное снижение АД.

Альбетор увеличивает продолжительность действия недеполяризующих миорелаксантов и антикоагулянтный эффект кумаринов.

При одновременном применении с три- и тетрациклическими антидепрессантами, антипсихотическими средствами (нейролептиками), этанолом, седативными и снотворными средствами усиливается угнетающее действие на ЦНС.

При одновременном применении с ингибиторами МАО наблюдается значительное усиление гипотензивного действия (одновременное применение противопоказано).

Особые указания и меры предосторожности:

При в/в введении препарата необходим строгий контроль АД, ЧСС, ЭКГ.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не изучены).

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 5° до 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Albetor