

Альбетор (таблетки)



Код АТХ:

- [C07AG](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки от белого до белого с кремоватым оттенком цвета, с незначительной мраморностью, плоскоцилиндрические, с фаской и риской.

	1 таб.
бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола гидрохлорид (проксодолол)	10 мг
"_"	40 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, повидон, кальция стеарат.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Неселективный альфа- и бета-адреноблокатор. Оказывает антигипертензивное, антиангинальное и антиаритмическое действие, относится к антиаритмикам класса II. Уменьшает ЧСС, расширяет сосуды, снижает ОПСС и уменьшает минутный объем крови.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Альбетор не предоставлены.

Показания к применению:

- артериальная гипертензия;
- профилактика приступов стенокардии;
- хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии).

Относится к болезням:

- [Артериальная гипертензия](#)
- [Гипертензия](#)
- [Стенокардия](#)

Противопоказания:

- брадикардия;
- AV-блокада II и III степени;
- хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;
- кардиогенный шок;
- артериальная гипотензия;
- ХОБЛ;
- бронхиальная астма;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не изучены);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при AV-блокаде I степени, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарном диабете типа 1 (опасность маскировки гипогликемических состояний).

Способ применения и дозы:

Препарат следует принимать внутрь 3 раза/сут, запивая небольшим количеством воды.

При *артериальной гипертензии* и *ИБС* средняя суточная доза препарата составляет 80-120 мг, максимальная суточная доза - 240 мг.

Лечение следует начинать с дозы 30 мг/сут - по 10 мг (1 таб.) 3 раза/сут. При хорошей переносимости препарата через 2-3 дня дозу следует увеличить до 60-80 мг/сут, разделенные на 3 приема. При недостаточности терапевтического эффекта дозу следует увеличить до 100-120 мг/сут.

При *хронической сердечной недостаточности* средняя суточная доза препарата составляет 45-60 мг. Начальная суточная доза составляет 15 мг (по 5 мг 3 раза/сут), при хорошей переносимости дозу увеличивают на 10-15 мг через каждые 2-3 дня до достижения дозы 45-60 мг/сут.

Побочное действие:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, чрезмерное снижение АД, похолодание конечностей, блокада ножек пучка Гиса, AV-блокада.

Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, гастралгия, тошнота.

Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, астения.

Аллергические реакции: местная или генерализованная экзантема, крапивница.

Альбетор (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Прочие: бронхоспазм, повышение сократимости миометрия, повышенная утомляемость, повышенное потоотделение, озноб.

Передозировка:

Симптомы: усиление выраженности побочных эффектов.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Другие альфа- и бета-адреноблокаторы усиливают гипотензивное действие проксодолола.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении препарата возможно уменьшение продукции слезной жидкости, что необходимо учитывать при назначении препарата пациентам, пользующимся контактными линзами.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Albetor_tabletki