

## Альбурекс



### Код АТХ:

- [B05AA01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Альбумин человека](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)
- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Средство, получаемое путем фракционирования крови, плазмы, плаценты, сыворотки от здоровых доноров. Поддерживает коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление крови, увеличивает ОЦК, повышает АД. Способствует проникновению тканевой жидкости в кровяное русло. Является источником белка.

### Показания к применению:

Травматический и послеоперационный шок, ожоги, сопровождающиеся дегидратацией и концентрацией крови, гипопротейнемия и гипоальбуминемия, развивающиеся при нутритивной дистрофии, нефротических синдромах, гломерулонефритах, циррозе печени, длительных гнойных процессах, поражении ЖКТ с нарушением питания больного (в т.ч. язвенная болезнь, опухоли).

### Относится к болезням:

- [Нефрит](#)
- [Ожоги](#)
- [Опухоли](#)
- [Шок](#)
- [Язвенная болезнь](#)

## **Противопоказания:**

Тромбоз, артериальная гипертензия, продолжающееся внутреннее кровотечение, тяжелая анемия, тяжелые формы сердечной недостаточности, повышенная чувствительность к альбумину человеческого.

## **Способ применения и дозы:**

Индивидуальный, в зависимости от показаний и клинической ситуации.

## **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* возможны тошнота, рвота, гиперсаливация.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* артериальная гипотензия, тахикардия.

*Аллергические реакции:* возможна крапивница; редко - анафилактический шок.

*Прочие:* возможны повышение температуры тела, боли в поясничной области.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности применение альбумина человеческого возможно только в случаях крайней необходимости.

Данные о безопасности применения альбумина человеческого в период лактации отсутствуют.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении альбумина человеческого с ингибиторами АПФ повышается риск развития артериальной гипотензии.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Пациентам с дегидратацией перед введением альбумина человеческого следует обеспечить достаточное поступление жидкости в организм.

С осторожностью применяют у пациентов со сниженным сердечным резервом из-за повышенного риска развития острой сердечной недостаточности.

При применении препаратов из крови и плазмы человека нельзя полностью исключить вероятность заражения инфекционными заболеваниями.

### **Применение в пожилом возрасте**

С осторожностью применяют у пациентов со сниженным сердечным резервом из-за повышенного риска развития острой сердечной недостаточности.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Albureks>