Алерза



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Цетиризин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** от белого до кремовато-белого цвета, капсуловидной формы, с разделительной риской с одной стороны и тиснением "B" и "L", на другой стороне тиснение "10".

	1 таб.
цетиризина гидрохлорид	10 мг

7 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
7 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Активное вещество препарата - цетиризин, относится к группе конкурентных антагонистов гистамина, блокирует H_1 - гистаминовые рецепторы. Цетиризин оказывает влияние на гистаминзависимую стадию аллергических реакций, а также уменьшает миграцию эозинофилов, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления на клеточной стадии аллергической реакции. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает противоэкссудативное, противозудное действие, практически не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия. В терапевтических дозах практически не оказывает седативного действия.

Фармакокинетика

Быстро всасывается при приеме внутрь. C_{max} в сыворотке достигается через 1 ч после перорального приема. В небольших количествах метаболизируется в печени. $T_{1/2}$ составляет у взрослых 7-10 ч, у детей 6-12 лет - 6 ч.

Показания к применению:

— сезонный и круглогодичный аллергический ринит и конъюнктивит;

— поллиноз (сенная лихорадка);

— идиопатическая крапивница и другие аллергические дерматозы, сопровождающиеся зудом и высыпаниями.

Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия
- Дерматит
- Зуд
- Конъюнктивит
- Крапивница
- Лихорадка
- Поллиноз
- Ринит
- Сенная лихорадка

Противопоказания:

— детский возраст (до 6 лет);

— беременность, период лактации;

— повышенная чувствительность к гидроксизину и другим компонентам препарата.

С осторожностью при нарушении функции печени и/или почек, лицам пожилого возраста.

Способ применения и дозы:

Внутрь **взрослым и детям старше 12 лет** -1 таб. (10 мг) 1 раз/сут.

Детям от 6-12 лет - по 1 таб. (10 мг) - 1 раз/сут или по 1/2 таб. (5 мг) 2 раза/сут.

Пациентам с почечной недостаточностью умеренной степени тяжести (КК 11-13 мл/мин), пациентам, находящимся на гемодиализе (КК менее 7 мл/мин) и пациентам с нарушением печеночной функции рекомендуется назначать по 1/2 таб./сут.

При случайном пропуске времени приема препарата, очередную дозу следует принять при первой же возможности. В том случае, если приближается время очередного приема препарата, очередную дозу следует принять по графику, не увеличивая общей дозы.

Препарат Алерза можно принимать вне зависимости от приема пищи.

Таблетки следует проглатывать, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможны головная боль, сонливость, головокружение, возбуждение, сухость во рту, нарушения со стороны ЖКТ в виде диспепсии, боли в животе, метеоризма.

Аллергические реакции: ангионевротический отек, сыпь, крапивница, зуд.

Передозировка:

Симптомы: прием препарата однократно в дозе свыше 5 таблеток может сопровождаться признаками интоксикации в виде сонливости; у детей передозировка препаратом может сопровождаться беспокойством и повышенной раздражительностью, возможно появление признаков антихолинергического действия в виде задержки мочи, сухости во рту, запора.

Лечение: прием препарата следует прекратить, необходимо промыть желудок, принять активированный уголь, немедленно обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано: беременность, период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется без консультации врача сочетать прием препарата Алерза с другими лекарственными средствами.

При одновременном приеме с бронхолитическими средствами, содержащими в качестве действующего вещества теофиллин, возможно увеличение частоты побочных эффектов цетиризина.

Данных о взаимодействии цетиризина с алкоголем до настоящего времени не получено, несмотря на это, употребление спиртных напитков при лечении цетиризином не рекомендуется.

Особые указания и меры предосторожности:

Лицам, принимающим препарат, необходимо соблюдать осторожность при работе, требующей высокой скорости психических и физических реакций (управление транспортными средствами, обслуживание машин, работа на высоте и т.д.).

При нарушениях функции почек

С осторожностью при нарушении функции почек.

При нарушениях функции печени

С осторожностью при нарушении функции печени.

Применение в пожилом возрасте

С осторожностью лицам пожилого возраста.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст (до 6 лет).

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре ниже 25°С. Срок годности **-** 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Alerza