

## Альфохолин-Лекфарм



### **Код АТХ:**

- [N07AX02](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Холина альфосцерат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

**Раствор для в/в и в/м введения** прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый.

	<b>1 мл</b>
холина альфосцерат	250 мг

Вспомогательные вещества: вода д/и - до 1 мл.

4 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

4 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Нейротропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Холиномиметик. Является предшественником ацетилхолина. Оказывает влияние преимущественно на холинергические рецепторы в ЦНС. Глицерофосфат, который образуется при расщеплении холина альфосцерата, является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) мембраны нейрона. Облегчает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах, улучшает пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов.

### **Показания к применению:**

Острый период черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем поражения, хроническая цереброваскулярная недостаточность (дисциркуляторная энцефалопатия); синдром деменции различного генеза, в

т.ч. болезнь Альцгеймера; ишемический инсульт (ранний и поздний восстановительный период); хорей Геттингтона; старческая псевдомеланхолия.

### Относится к болезням:

- [Болезнь Альцгеймера](#)
- [Деменция](#)
- [Дисциркуляторная энцефалопатия](#)
- [Инсульт](#)
- [Ишемический инсульт](#)
- [Травмы](#)
- [Хорей](#)
- [Цереброваскулярная недостаточность](#)
- [Черепно-мозговая травма](#)
- [Энцефалит](#)

### Противопоказания:

Беременность, лактация, повышенная чувствительность к холина альфосцерату.

### Способ применения и дозы:

Внутрь: по 400 мг 3 раза/сут, курс лечения 3-6 мес. В/м или в/в: 1 г/сут.

### Побочное действие:

Диагнозы

- Бессонница
- Болезнь Альцгеймера
- Болезнь Паркинсона (паркинсонизм)
- Боли в спине

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

### Особые указания и меры предосторожности:

При возникновении тошноты дозу следует уменьшить.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Alfoholin-Lekfarm>