

[Алкаин](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Проксиметакаин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство для местной анестезии в офтальмологической практике. Действие начинается через 30 сек после инстилляци и продолжается 15 мин при однократном закапывании.

Показания к применению:

В офтальмологии для проведения кратковременных диагностических и лечебных процедур, требующих быстрой и кратковременной анестезии: в т.ч. тонометрия, тоноскопия, удаление инородных тел.

Относится к болезням:

- [Анестезия](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к проксиметакаину.

Способ применения и дозы:

Для тонометрии и других коротких процедур закапывают по 1-2 капли непосредственно перед исследованием. При более продолжительных процедурах закапывают по 1-2 капли каждые 10-15 мин до 3-5 раз.

Побочное действие:

После закапывания в глаза *возможно* преходящее ощущение жжения и покраснение; *очень редко*: тяжелые аллергические реакции (диффузный эпителиальный кератит, некроз эпителия, диффузный отек стромы, ирит).

Особые указания и меры предосторожности:

Многokратное последовательное применение проксиметакаина вызывает уменьшение продолжительности его действия, что требует дополнительного закапывания. Однако в этом случае высок риск развития инфекции, помутнения или перфорации роговицы.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Alkain>