

## [Аллерго-Комод](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

↕ <b>Капли глазные</b>	<b>1 мл</b>
хромоглициевая кислота (в форме динатриевой соли)	20 мг

10 мл - флакон-капельницы пластиковые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Противоаллергическое средство, оказывает мембраностабилизирующее действие, препятствует дегрануляции тучных клеток и выделению из них гистамина, брадикинина, лейкотриенов и других биологически активных веществ. Препарат наиболее эффективен при профилактическом применении. Заметный клинический эффект при аллергических заболеваниях глаз наступает через несколько дней или недель.

#### **Фармакокинетика**

Абсорбция через слизистую оболочку глаза незначительна. Системная биодоступность - менее 0.03%.  $T_{1/2}$  - 5-10 мин.

### Показания к применению:

— лечение (в составе комплексной терапии) и профилактика аллергических конъюнктивитов (острых и хронических);

— для облегчения и снятия раздражения слизистой оболочки глаз, связанного с аллергическими реакциями: на факторы окружающей среды и средства бытовой химии; на профессиональные вредности, в том числе дым, запыленность, пары растворителей и других химических веществ; на действие косметических средств и лекарственных препаратов; на растения и домашних животных.

### Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Астения](#)
- [Конъюнктивит](#)

### Противопоказания:

- детский возраст (до 4 лет);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;

## Способ применения и дозы:

### *Лечение*

**Взрослым и детям с 4-х лет** закапывают по 1 капле в конъюнктивальный мешок 4 раза в день с интервалом 4-6 ч. При необходимости дозу можно увеличить до 6-8 закапываний. Длительность применения при аллергическом сезонном (остром) конъюнктивите - 7 дней, при хроническом аллергическом конъюнктивите - до 4-х недель.

### *Профилактика*

**Взрослым и детям с 4-х лет** закапывают по 1 капле препарата 4 раза в день в конъюнктивальный мешок, через равные интервалы времени. Применение начинают за 7-10 дней до возможного развития сезонного аллергического конъюнктивита и продолжают еще в течение 7-10 дней после исчезновения симптомов заболевания.

Перед каждым закапыванием нужно снимать защитный колпачок. Перед первым применением препарата переверните флакон капельницей вертикально вниз, удерживая его большим пальцем снизу и надавите средним и указательным пальцами на основание (дно) флакона несколько раз, пока на кончике капельницы не появится первая капля. Таким образом, приводится в действие механизм капельницы и извлекается только одна капля препарата. После этого флакон готов к дальнейшему использованию. Особая конструкция системы клапанов капельницы обеспечивает всегда одинаковый размер извлекаемой капли и одинаковую скорость ее извлечения даже при очень сильном надавливании на основание флакона.

Откиньте голову немного назад, слегка отведите пальцем нижнее веко и закапайте одну каплю в конъюнктивальный мешок, как описано выше. Медленно закройте глаза.

После окончания процедуры сразу же герметично наденьте на капельницу защитный колпачок.

При закапывании следует избегать контактов кончика капельницы с поверхностью глаза и кожей.

## Побочное действие:

Временное нарушение четкости зрительного восприятия, ощущение жжения, инородного тела, сухости в глазу, отек конъюнктивы, слезотечение, мейбомит.

*Аллергические реакции:* зуд, легкая болезненность и гиперемия конъюнктивы.

## Передозировка:

При местном применении в рекомендуемой дозе симптомов передозировки не отмечалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение во время беременности возможно только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Активное вещество препарата может выделяться с грудным молоком. При применении в период лактации грудное вскармливание следует прекратить на период лечения. В исследованиях на животных при парентеральном введении в высоких дозах наблюдалось снижение веса плода.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Снижает потребность в применении офтальмологических лекарственных средств, содержащих глюкокортикостероиды.

## Особые указания и меры предосторожности:

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими, потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и

## **Аллерго-Комод**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

быстроты психомоторных реакций.

Глазные капли Аллерго-Комод не содержат консервант, поэтому возможно применение у пациентов с непереносимостью консервантов или носящих контактные линзы. Контактные линзы следует снимать перед закапыванием и надевать не ранее чем через 15 мин после закапывания.

После вскрытия флакона и первого закапывания препарат можно использовать в течение 12 недель. На этикетке флакона и на картонной пачке предусмотрена специальная графа для заполнения: «Дата первого применения». Рекомендуется записать, когда Вы в первый раз закапали препарат.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 4 лет.

### **Условия хранения:**

При температуре не выше 25°C. Хранить в местах, недоступных для детей!

Срок годности:

- в закрытой оригинальной упаковке - 3 года.
- после вскрытия флакона - 12 недель.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Allergo-Komod>