

## [Аллергодил](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Азеластин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com<sup>англ</sup>](#)

### **Форма выпуска:**

◇ **Спрей назальный дозированный** в виде прозрачного, бесцветного или почти бесцветного раствора.

	<b>1 доза</b>	<b>1 фл.</b>
азеластина гидрохлорид	140 мкг	10 мг

*Вспомогательные вещества:* гипромеллоза, динатрия эдетата дигидрат, лимонная кислота безводная, натрия гидрофосфата додекагидрат, натрия хлорид, вода очищенная.

10 мл - флаконы темного стекла (1) с дозатором-распылителем - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Интермедианты](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Блокатор гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов, производное фталазинона. Оказывает длительное противоаллергическое и мембраностабилизирующее действие, снижает проницаемость капилляров и экссудацию, стабилизирует мембрану тучных клеток и препятствует высвобождению из них биологически активных веществ (в т.ч. гистамин, серотонин, лейкотриены, фактор, активирующий тромбоциты), вызывающих бронхоспазм и способствующих развитию ранней и поздней стадии аллергических реакций и воспаления.

При местном применении системное действие незначительное.

При интраназальном введении уменьшает зуд и заложенность носа, чиханье и ринорею. Ослабление симптомов аллергического ринита отмечается начиная с 15 мин после применения и продолжается до 12 ч и более.

При длительном применении в высоких дозах не наблюдалось клинически значимого воздействия азеластина на интервал QT.

### **Фармакокинетика**

Биодоступность после *интраназального применения* около 40%.  $C_{max}$  в крови после интраназального применения достигается через 2-3 ч. При применении интраназально в рекомендованной суточной дозе 1.1 мг  $C_{ss}$  в крови составляет менее 1% от дозы (1 нг/мл). Концентрация препарата в сыворотке крови после интраназального применения в 8 раз ниже, чем после приема внутрь. У пациентов, страдающих аллергическим ринитом, концентрация в крови более высокая, чем у здоровых.

Другие фармакокинетические данные изучены при применении *внутри*.

Связывание с белками крови - 80-90%.

Метаболизируется в печени путем окисления с участием системы цитохрома P450 с образованием активного метаболита дезметилазеластина.

Выводится в основном почками в виде неактивных метаболитов.  $T_{1/2}$  азеластина - около 20 ч, его активного метаболита дезметилазеластина - около 45 ч.

### **Показания к применению:**

- лечение сезонного и круглогодичного аллергического ринита (в т.ч. сенная лихорадка) и риноконъюнктивита;
- лечение симптомов вазомоторного (круглогодичного неаллергического) ринита, таких как заложенность носа, ринорея, чиханье, постназальный синдром.

### **Относится к болезням:**

- [Аллергия](#)
- [Лихорадка](#)
- [Ринит](#)

### **Противопоказания:**

- детский возраст до 6 лет (при аллергическом рините и риноконъюнктивите);
- детский возраст до 12 лет (при вазомоторном рините);
- повышенная чувствительность к азеластину и/или другим компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Применяют интраназально.

При *аллергическом рините и риноконъюнктивите* **взрослым и детям 6 лет и старше** вводят по 1 дозе (140 мкг/0.14 мл) в каждый носовой ход 2 раза/сут утром и вечером. При необходимости взрослым и детям старше 12 лет - по 2 дозы (280 мкг/0.28 мл) в каждый носовой ход 2 раза/сут утром и вечером. Аллергодил применяется до прекращения симптомов и подходит для продолжительного применения, но не более 6 месяцев непрерывного лечения.

При *вазомоторном рините* **взрослым и детям старше 12 лет** назначают по 2 дозы (280 мкг/0.28 мл) в каждый носовой ход 2 раза/сут утром и вечером. Аллергодил применяется до прекращения симптомов и подходит для продолжительного применения, но не более 8 недель непрерывного лечения.

### **Правила применения препарата Аллергодил**

1. Снять защитный колпачок.
2. Перед первым использованием нажать на распылитель 2-3 раза.

3. В зависимости от назначенной дозы впрыснуть по 1 или по 2 раза в каждую ноздрю, держа при этом голову прямо.

4. Снова надеть защитный колпачок.

### **Побочное действие:**

*Местные реакции:* редко - слабое, преходящее раздражение воспаленной слизистой оболочки носа, проявляющееся жжением, зудом, чиханьем, очень редко носовым кровотечением.

*Аллергические реакции:* очень редко - сыпь, кожный зуд, крапивница.

*Системные реакции:* очень редко - слабость, головокружение (может быть вызвано самим заболеванием).

В результате неправильного способа введения, когда голова запрокинута назад, возможно появление горького вкуса во рту, что в редких случаях может вызывать тошноту.

### **Передозировка:**

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Аллергодил не сообщалось.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Аллергодил не рекомендуют применять при беременности и в период лактации, поскольку не имеется опыта применения азеластина в эти периоды.

В *экспериментальных исследованиях* при применении в дозах, многократно превышающих терапевтический диапазон, данных о тератогенном действии азеластина не получено.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При интраназальном применении азеластина не выявлено взаимодействия с другими лекарственными средствами.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В отдельных случаях при употреблении назального спрея выявляется усталость, различной степени выраженности и слабость, которые могут быть вызваны также и основным заболеванием. В этих случаях не рекомендуется управлять автомобилем и работать с опасными механизмами. Употребление алкоголя может усилить эти явления.

#### **Применение в детском возрасте**

Противопоказано: детский возраст до 6 лет (при аллергическом рините и риноконъюнктивите); детский возраст до 12 лет (при вазомоторном рините).

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 8° до 25°С. После вскрытия флакона спрей следует использовать в течение не более 6 месяцев.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

## **Аллергодил**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Allergodil>