

[Аллергодил С](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Блокатор гистаминовых H₁-рецепторов, производное фталазинона. Оказывает выраженное противоаллергическое действие. Кроме того, ингибирует высвобождение медиаторов воспаления из тучных клеток.

Фармакокинетика

После интраназального применения около 40% достигает системного кровообращения. Метаболизируется в печени. Выводится главным образом с калом.

Показания к применению:

Сезонный и круглогодичный ринит, риноконъюнктивит, конъюнктивит.

Относится к болезням:

- [Конъюнктивит](#)
- [Ринит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к азеластину.

Способ применения и дозы:

Внутри по 2 мг на ночь. Применяют интраназально и местно в офтальмологии 1-2 раза/сут.

Побочное действие:

Редко: сухость и раздражение слизистой оболочки полости носа, нарушение вкусовых ощущений, сухость во рту, нарушение аппетита, тошнота, рвота, боли в эпигастрии, кожная сыпь, жажда, увеличение массы тела.

В единичных случаях: носовое кровотечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не применяют в I триместре беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Безопасность применения у детей в возрасте до 6 лет не изучена.

Не применяют в I триместре беременности и в период лактации.

Применение в детском возрасте

Безопасность применения у детей в возрасте до 6 лет не изучена.

Источник: http://drugs.thead.ru/Allergodil_S