

## [Аллергодил \(капли\)](#)



### Код АТХ:

- [R01AC03](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Азеластин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капли глазные 0.05%** в виде бесцветного, прозрачного или почти прозрачного, практически свободного от механических включений раствора.

	<b>1 мл</b>
азеластина гидрохлорид	500 мкг

*Вспомогательные вещества:* гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), динатрия эдетат, бензалкония хлорид, сорбитол 70%, натрия гидроксид, вода д/и.

6 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с капельницей - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедианты](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Блокатор гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов, производное фталазинона. Оказывает сильное и длительное

## Аллергодил (капли)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

продолгованное противоаллергическое действие. При внутриглазном применении проявляются дополнительные противовоспалительный и мембраностабилизирующий эффекты: азеластин тормозит синтез и высвобождение медиаторов ранней и поздней фазы аллергических реакций (в т.ч. лейкотриена, гистамина, фактора активации тромбоцитов и серотонина, снижает количество клеток молекулярной адгезии и эозинофилов).

Клинически значимого воздействия на интервал QT не выявлено даже при длительном применении азеластина в высоких дозах.

### Фармакокинетика

При повторном применении Аллергодила в форме глазных капель (1 капле в каждый глаз 4 раза/сут)  $C_{max}$  были очень низкими и выявлялись на пределе или ниже предела измерений.

## Показания к применению:

- профилактика и лечение сезонного аллергического конъюнктивита;
- лечение несезонного (круглогодичного) аллергического конъюнктивита.

## Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Конъюнктивит](#)

## Противопоказания:

- детский возраст до 4 лет;
- повышенная чувствительность к азеластину или другим компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

*Сезонный аллергический конъюнктивит:* **взрослым и детям старше 4 лет** назначают по 1 капле в каждый глаз 2 раза/сут (утром и вечером). При необходимости частоту применения увеличивают до 4 раз/сут.

В случае предполагаемого воздействия аллергена препарат применяют с профилактической целью.

*Несезонный (круглогодичный) аллергический конъюнктивит:* **взрослым и детям 12 лет и старше** назначают по 1 капле в каждый глаз 2 раза/сут (утром и вечером). При необходимости частоту применения увеличивают до 4 раз/сут.

### Правила применения препарата Аллергодил

1. Чистой салфеткой осушить кожу вокруг глаз.
2. Отвернуть крышечку и убедиться, что капельница чистая.
3. Осторожно оттянуть вниз нижнее веко.
4. Осторожно, не касаясь капельницей глазного яблока и слизистой оболочки, нанести одну каплю препарата на середину нижнего века.
5. Опустить нижнее веко и слегка прижать пальцем внутренний угол глаза. Удерживая палец, моргнуть несколько раз. Излишек препарата промокнуть салфеткой.
6. Повторить то же самое для другого глаза.

## Побочное действие:

*Со стороны органа зрения:* повышение чувствительности глаза, ощущение инородного тела, изменение цвета конъюнктивальной оболочки, раздражение, болезненность, зуд, покраснение, отек, повышенное слезоотделение; редко - сухость глаз, блефарит.

*Системные реакции:* диспноэ, дисгевзия, сухость кожи.

## **Передозировка:**

Данные о передозировке препарата Аллергодил отсутствуют.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Аллергодил в форме глазных капель не рекомендуют применять в I триместре беременности, а также в период лактации.

В *экспериментальных исследованиях* при применении в дозах, многократно превышающих терапевтический диапазон, данных о тератогенном действии азеластина не получено.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Аллергодил не выявлено.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Аллергодил может использоваться для лечения инфекционных заболеваний глаз в составе комплексной терапии (по рекомендации врача).

В случае сопутствующей терапии другими глазными каплями их следует закапывать в глаза с интервалом не менее 15 мин.

В период применения глазных капель не рекомендуют носить контактные линзы.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано: детский возраст до 4 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. После вскрытия флакона капли глазные следует использовать в течение 4 недель.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Allergodil\\_kapli](http://drugs.thead.ru/Allergodil_kapli)