

[Аллергодил \(капли\)](#)



Код АТХ:

- [R01AC03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Азеластин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли глазные 0.05%** в виде бесцветного, прозрачного или почти прозрачного, практически свободного от механических включений раствора.

	1 мл
азеластина гидрохлорид	500 мкг

Вспомогательные вещества: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), динатрия эдетат, бензалкония хлорид, сорбитол 70%, натрия гидроксид, вода д/и.

6 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с капельницей - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедианты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Блокатор гистаминовых H₁-рецепторов, производное фталазинона. Оказывает сильное и длительное

Аллергодил (капли)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

продолгованное противоаллергическое действие. При внутриглазном применении проявляются дополнительные противовоспалительный и мембраностабилизирующий эффекты: азеластин тормозит синтез и высвобождение медиаторов ранней и поздней фазы аллергических реакций (в т.ч. лейкотриена, гистамина, фактора активации тромбоцитов и серотонина, снижает количество клеток молекулярной адгезии и эозинофилов).

Клинически значимого воздействия на интервал QT не выявлено даже при длительном применении азеластина в высоких дозах.

Фармакокинетика

При повторном применении Аллергодила в форме глазных капель (1 капле в каждый глаз 4 раза/сут) C_{max} были очень низкими и выявлялись на пределе или ниже предела измерений.

Показания к применению:

- профилактика и лечение сезонного аллергического конъюнктивита;
- лечение несезонного (круглогодичного) аллергического конъюнктивита.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Конъюнктивит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 4 лет;
- повышенная чувствительность к азеластину или другим компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Сезонный аллергический конъюнктивит: **взрослым и детям старше 4 лет** назначают по 1 капле в каждый глаз 2 раза/сут (утром и вечером). При необходимости частоту применения увеличивают до 4 раз/сут.

В случае предполагаемого воздействия аллергена препарат применяют с профилактической целью.

Несезонный (круглогодичный) аллергический конъюнктивит: **взрослым и детям 12 лет и старше** назначают по 1 капле в каждый глаз 2 раза/сут (утром и вечером). При необходимости частоту применения увеличивают до 4 раз/сут.

Правила применения препарата Аллергодил

1. Чистой салфеткой осушить кожу вокруг глаз.
2. Отвернуть крышечку и убедиться, что капельница чистая.
3. Осторожно оттянуть вниз нижнее веко.
4. Осторожно, не касаясь капельницей глазного яблока и слизистой оболочки, нанести одну каплю препарата на середину нижнего века.
5. Опустить нижнее веко и слегка прижать пальцем внутренний угол глаза. Удерживая палец, моргнуть несколько раз. Излишек препарата промокнуть салфеткой.
6. Повторить то же самое для другого глаза.

Побочное действие:

Со стороны органа зрения: повышение чувствительности глаза, ощущение инородного тела, изменение цвета конъюнктивальной оболочки, раздражение, болезненность, зуд, покраснение, отек, повышенное слезоотделение; редко - сухость глаз, блефарит.

Системные реакции: диспноэ, дисгевзия, сухость кожи.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Аллергодил отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Аллергодил в форме глазных капель не рекомендуют применять в I триместре беременности, а также в период лактации.

В *экспериментальных исследованиях* при применении в дозах, многократно превышающих терапевтический диапазон, данных о тератогенном действии азеластина не получено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Аллергодил не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Аллергодил может использоваться для лечения инфекционных заболеваний глаз в составе комплексной терапии (по рекомендации врача).

В случае сопутствующей терапии другими глазными каплями их следует закапывать в глаза с интервалом не менее 15 мин.

В период применения глазных капель не рекомендуют носить контактные линзы.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 4 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. После вскрытия флакона капли глазные следует использовать в течение 4 недель.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Allergodil_kapli