Аллергоферон



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Интерферон альфа-2b
- Лоратадин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Гель для местного и наружного применения белого или белого с сероватым оттенком цвета со слабым специфическим запахом.

	1 г
интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный	5000 МЕ
лоратадин	0.01 г

Вспомогательные вещества: сорбиновая кислота 2 мг, динатрия эдетата дигидрат 1 мг, карбомер 10 мг, троламин 10 мг, макрогол 4000 150 мг, макрогол 400 300 мг, вода очищенная до 1000 мг.

5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Интермедианты
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает антигистаминным, противоаллергическим, противозудным, антиэкссудативным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, противовирусным действием.

Фармакокинетика

Концентрация действующих веществ, достигаемая в крови, значительно ниже предела обнаружения (предел определения интерферона альфа-2b -1-2 МЕ/мл) и не имеет клинической значимости.

Показания к применению:

— поллиноз (сезонный аллергический ринит, аллергический конъюнктивит);

— круглогодичный аллергический ринит, аллергический конъюнктивит.

Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия
- Конъюнктивит
- Поллиноз
- Ринит

Противопоказания:

— детский возраст;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *аллергическом рините* рекомендуется применять препарат путем нанесения по 1 см геля на слизистую оболочку каждого носового хода 4 раза/сут в течение 5-7 дней в стадии обострения, с последующим снижением частоты приема препарата до исчезновения клинической картины заболевания. После нанесения геля помассировать пальцами крылья носа для равномерного распределения препарата на слизистой оболочке носовых ходов.

При *аллергическом конъюнктивите* рекомендуется применять препарат путем нанесения по 1 см геля на кожу верхнего и нижнего века 4 раза/сут в течение 5-7 дней в стадии обострения, с последующим снижением частоты приема препарата до исчезновения клинической картины заболевания.

После исчезновения клинических симптомов применение препарата рекомендуется прекратить. Максимальный непрерывный курс лечения не должен превышать 6 недель.

Побочное действие:

Редко: чиханье, возможны зуд и временное нарушение обоняния при нанесении препарата.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата не выявлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные по использованию препарата при беременности и в период лактации отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно сочетание с применением антигистаминных препаратов системного действия.

Особые указания и меры предосторожности:

При нанесении препарата на веки исключить использование косметических средств.

Применение в детском возрасте

Противопоказан.

Условия хранения:

Препарат хранят при температуре от 2° до 8°C. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности - 2 года

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Allergoferon