

## [Аллергоферон](#)



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Интерферон альфа-2b](#)
- [Лоратадин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [Википедия](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#)  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Гель для местного и наружного применения** белого или белого с сероватым оттенком цвета со слабым специфическим запахом.

	<b>1 г</b>
интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный	5000 МЕ
лоратадин	0.01 г

*Вспомогательные вещества:* сорбиновая кислота 2 мг, динатрия эдетата дигидрат 1 мг, карбомер 10 мг, троламин 10 мг, макрогол 4000 150 мг, макрогол 400 300 мг, вода очищенная до 1000 мг.

5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедианты](#)
- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Препарат обладает антигистаминным, противоаллергическим, противозудным, антиэкссудативным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, противовирусным действием.

#### **Фармакокинетика**

Концентрация действующих веществ, достигаемая в крови, значительно ниже предела обнаружения (предел определения интерферона альфа-2b -1-2 МЕ/мл) и не имеет клинической значимости.

### Показания к применению:

— поллиноз (сезонный аллергический ринит, аллергический конъюнктивит);

— круглогодичный аллергический ринит, аллергический конъюнктивит.

### Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Конъюнктивит](#)
- [Поллиноз](#)
- [Ринит](#)

### Противопоказания:

— детский возраст;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

При *аллергическом рините* рекомендуется применять препарат путем нанесения по 1 см геля на слизистую оболочку каждого носового хода 4 раза/сут в течение 5-7 дней в стадии обострения, с последующим снижением частоты приема препарата до исчезновения клинической картины заболевания. После нанесения геля помассировать пальцами крылья носа для равномерного распределения препарата на слизистой оболочке носовых ходов.

При *аллергическом конъюнктивите* рекомендуется применять препарат путем нанесения по 1 см геля на кожу верхнего и нижнего века 4 раза/сут в течение 5-7 дней в стадии обострения, с последующим снижением частоты приема препарата до исчезновения клинической картины заболевания.

После исчезновения клинических симптомов применение препарата рекомендуется прекратить. Максимальный непрерывный курс лечения не должен превышать 6 недель.

### Побочное действие:

*Редко:* чиханье, возможны зуд и временное нарушение обоняния при нанесении препарата.

### Передозировка:

Случаи передозировки препарата не выявлены.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные по использованию препарата при беременности и в период лактации отсутствуют.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно сочетание с применением антигистаминных препаратов системного действия.

### Особые указания и меры предосторожности:

При нанесении препарата на веки исключить использование косметических средств.

#### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан.

## **Аллергоферон**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### **Условия хранения:**

Препарат хранят при температуре от 2° до 8°С. Хранить в недоступном для детей месте.  
Срок годности - 2 года

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Allergoferon>