

## Аллертек



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые оболочкой** от белого до кремового цвета, продолговатые, с односторонней разделительной риской.

	<b>1 таб.</b>
Цетиризина дигидрохлорид	10 мг

*Вспомогательные вещества:* лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, поливинилпирролидон 25, магния стеарат, натрия глюконат крахмала, силикагель, натрия лаурилсульфат.

*Состав оболочки:* оксипропилметилцеллюлоза, полиэтиленгликоль 6000.

7 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Блокатор периферических гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов. Оказывает противоаллергическое действие. Влияет на раннюю гистаминозависимую стадию аллергических реакций, уменьшает миграцию эозинофилов, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления на поздней, клеточной стадии аллергических реакций. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает противозудное действие. Практически не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия. В терапевтических дозах не вызывает седативного эффекта.

Действие препарата проявляется через 20 мин (у 50% пациентов), через 60 мин (у 95% пациентов) после приема препарата и продолжается до 24 ч.

#### Фармакокинетика

##### Всасывание

После приема внутрь цетиризин быстро и хорошо всасывается из ЖКТ. C<sub>max</sub> в плазме крови достигается через 30-60 мин. Прием пищи не оказывает существенного влияния на величину абсорбции, однако в этом случае скорость всасывания незначительно снижается.

##### Распределение

Связывание с белками плазмы составляет 93%. V<sub>d</sub> составляет около 0.5 л/кг. Не проникает через ГЭБ и внутрь клетки. При применении препарата в дозе 10 мг в течение 10 дней накопления препарата не наблюдается.

### Метаболизм

Цетиризин слабо метаболизируется в печени с образованием неактивного метаболита.

### Выведение

Около 70% принятой дозы цетиризина выводится почками в основном в неизменном виде. После однократного приема разовой дозы  $T_{1/2}$  составляет около 10 ч.

### Фармакокинетика в особых клинических случаях

У детей в возрасте от 2 до 12 лет  $T_{1/2}$  составляет 5-6 ч.

При нарушении функции почек (КК менее 11-31 мл/мин) и у пациентов, находящихся на гемодиализе (КК менее 7 мл/мин),  $T_{1/2}$  увеличивается в 3 раза, клиренс уменьшается на 70%.

При хронических заболеваниях и у пациентов пожилого возраста отмечается увеличение  $T_{1/2}$  на 50% и уменьшение клиренса на 40%.

## Показания к применению:

- сезонный и круглогодичный аллергический ринит;
- аллергический конъюнктивит;
- поллиноз (сенная лихорадка);
- крапивница (в т.ч. хроническая идиопатическая);
- зудящие аллергические дерматозы (в т.ч. атопический дерматит, нейродермит);
- отек Квинке.

## Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Атопический дерматоз](#)
- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Конъюнктивит](#)
- [Крапивница](#)
- [Лихорадка](#)
- [Нейродермит](#)
- [Поллиноз](#)
- [Ринит](#)
- [Сенная лихорадка](#)

## Противопоказания:

- детский возраст до 6 лет;
- беременность;
- период лактации (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при хронической почечной недостаточности средней и тяжелой степени (требуется коррекция режима дозирования), а также больным пожилого возраста (возможно снижение клубочковой фильтрации).

## Способ применения и дозы:

**Взрослым и детям старше 12 лет** назначают 10 мг (1 таб.) /сут.

**Детям в возрасте от 6 до 12 лет** препарат назначают по 5 мг (1/2 таб.) 2 раза/сут утром и вечером или по 10 мг (1 таб.) 1 раз/сут.

При **почечной недостаточности** дозу следует уменьшить в 2 раза.

При **нарушениях функции печени** дозу подбирают индивидуально, особенно при одновременной почечной недостаточности.

**Пациентам пожилого возраста с нормальной функцией почек** коррекции дозы не требуется.

Препарат можно принимать вне зависимости от приема пищи, предпочтительно вечером. Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

## **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* сухость во рту; в отдельных случаях - диспепсия, боли в животе, метеоризм.

*Со стороны ЦНС:* в отдельных случаях - головная боль, сонливость, головокружение, возбуждение.

*Аллергические реакции:* в единичных случаях - крапивница, ангионевротический отек, одышка (пациент должен быть предупрежден о необходимости немедленного прекращения приема препарата).

Препарат в целом хорошо переносится.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* сонливость (при однократном приеме препарата в дозе свыше 50 мг); у детей - беспокойство, повышенная раздражительность; возможен антихолинергический эффект (задержка мочеиспускания, сухость во рту, запор).

*Лечение:* промывание желудка, прием активированного угля; при необходимости проводят симптоматическую терапию. Гемодиализ неэффективен.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Аллертек не рекомендуют применять при беременности. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении Аллертека с теофиллином возможно увеличение частоты побочных эффектов.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью назначают препарат лицам пожилого возраста и пациентам с нарушениями функции печени и/или почек.

Пациента следует предупредить о необходимости сообщать врачу о возникновении любых побочных эффектов на фоне приема препарата.

Пациента следует предупредить о необходимости избегать одновременного применения Аллертека с другими лекарственными средствами без назначения врача.

Данных о взаимодействии цетиризина с этанолом до настоящего времени не получено, несмотря на это употребление алкоголя на фоне применения препарата Аллертек не рекомендуется.

### *Использование в педиатрии*

Препарат не назначают **детям в возрасте до 6 лет**.

### *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

С осторожностью назначают препарат пациентам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности,

требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

**При нарушениях функции почек**

**Пациентам с выраженными нарушениями функции почек** дозу препарата снижают.

**При нарушениях функции печени**

**Пациентам с выраженными нарушениями функции печени** дозу препарата снижают.

**Применение в пожилом возрасте**

С *осторожностью* следует назначать препарат больным пожилого возраста (возможно снижение клубочковой фильтрации).

**Применение в детском возрасте**

Противопоказано: детский возраст до 6 лет.

**Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

**Срок годности:**

4 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Allertek>