

Аллохол-УБФ



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Активированный уголь](#)
- [Желчь](#)
- [Крапивы двудомной листья](#)
- [Чеснока посевного луковицы](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Желчегонное (холекинетическое и холеретическое) средство, снижает процессы гниения и брожения в кишечнике.

Усиливает секреторную функцию клеток печени, рефлекторно повышает секреторную и двигательную активность органов ЖКТ.

Показания к применению:

- хронический реактивный гепатит;
- холангит;
- холецистит;
- дискинезия желчевыводящих путей;
- атонические запоры;
- постхолецистэктомический синдром.

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)

- [Гепатоз](#)
- [Дискинезия желчевыводящих путей](#)
- [Запор](#)
- [Холангит](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- калькулезный холецистит;
- обтурационная желтуха;
- острый гепатит;
- острая и подострая дистрофия печени;
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
- острый панкреатит.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды, по 1-2 таб. 3-4 раза/сут в течение 3-4 нед; при обострении - по 1 таб. 2-3 раза/сут в течение 1-2 мес.

Повторные курсы проводят с интервалом в 3 мес.

Побочное действие:

Диарея, аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции печени

Противопоказан при остром гепатите, острой и подострой дистрофии печени.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Allohol-UBF>