

Аллокин-альфа



Код АТХ:

- [J05AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гистидил-глицил-валил-серил-глицил-гистидил-глицил-глутаминил-гистидил-глицил-валил-гистидил-глицин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Лиофилизат для приготовления раствора для п/к введения в виде порошка или пористой массы, белого цвета, без запаха; гигроскопичен.

	1 амп.
Гистидил-глицил-валил-серил-глицил-гистидил-глицил-глутаминил-гистидил-глицил-валил-гистидил-глицин	1 мг

- 1 мг - ампулы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 1 мг - ампулы (1) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 1 мг - ампулы (2) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 1 мг - ампулы (2) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 1 мг - ампулы (3) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 1 мг - ампулы (3) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 1 мг - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 1 мг - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 1 мг - ампулы (10) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 1 мг - ампулы (10) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Показания к применению:

- хронический рецидивирующий герпес 1 и 2 типов;
- в составе комплексной терапии среднетяжелой (желтушной) формы острого гепатита В.

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Герпес](#)
- [Желтуха](#)

Противопоказания:

- выраженные аутоимунные заболевания;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат вводят п/к.

Стандартный курс лечения *рецидива герпеса* включает инъекции препарата в дозе 1 мг через день, всего на курс - 3 инъекции.

При *среднетяжелых формах острого гепатита В* препарат вводят после верификации диагноза в дозе 1 мг 3 раза в неделю в течение 3-х недель (всего 9 инъекций).

Для приготовления раствора для инъекций в качестве растворителя использовать 1 мл 0.9 % раствора натрия хлорида.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможны слабость, головокружение, образование новых элементов сыпи (при герпетической инфекции).

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки препарата установлено не было.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При лечении хронического рецидивирующего генитального герпеса может назначаться в комбинации с ацикловиром и его производными (препараты обладают разным механизмом действия и дополняют друг друга в лечении вирусной инфекции).

При остром гепатите В препарат назначается на фоне общепринятой базисной терапии.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Лечение рекомендуется начинать при появлении самых первых признаков заболевания, при гепатите В - не позднее 7-го дня от начала появления желтухи.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

При возникновении головокружения необходимо воздержаться от управления автомобилем и работы с техникой.

Условия хранения:

Хранить препарат в защищенном от света месте при температуре от 2° до 8°С. В недоступном для детей месте.

Не использовать после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Allokin-alfa>