

Алоэ сироп с железом



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Железа хлорид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)
- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Оказывает адаптогенное, общетонизирующее, слабительное, антисептическое, желчегонное и гемопоэтическое действие. Улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей, повышает общую неспецифическую резистентность организма и устойчивость слизистых оболочек к действию повреждающих агентов, ускоряет процессы регенерации. Стимулирует защитные функции гранулоцитов, восполняет дефицит железа. В составе гемоглобина и миоглобина обеспечивает транспорт кислорода в ткани; принимает участие в работе ферментов цикла Кребса, реакциях восстановления и окисления, а также в синтезе жирных кислот и глюкозы; оптимизирует функции допамина.

Показания к применению:

— гипохромная анемия.

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- беременность;
- хроническая почечная недостаточность;
- хроническая сердечная недостаточность;
- артериальная гипертензия;

Алоэ сироп с железом

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- метроррагия;
- геморрой;
- цистит;
- острые воспалительные заболевания органов ЖКТ;
- кровохарканье;
- холелитиаз;
- гемохроматоз, гемолитическая анемия, сидероахрестическая анемия.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 2.5-5 мл (разбавляют в 50 мл воды) 3 раза/сут в течение 15-30 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, повышение АД, гипертермия, тошнота, рвота, запоры или диарея.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан к применению при беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с лекарственными средствами, содержащими SH-группу.

При одновременном применении снижает абсорбцию антибиотиков группы тетрациклинов.

При одновременном применении антациды, овощи, хлебные злаки, яичный желток, чай снижают всасывание препарата, аскорбиновая кислота повышает.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан: хроническая почечная недостаточность.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aloe_sirop_s_zhelezom